

تاثیر یک دوره تمرین هوایی و مصرف کورکومین بر سطوح پروستاگلاندین E2 و پرولاکتین در زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی

لادن زودفکر، دکتر حسن متین همایی، دکتر بهمن تاروردی زاده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، گروه فیزیولوژی ورزشی، تهران، ایران، نشانی مکاتبه‌ی نویسنده‌ی مسئول: تهران، میدان

صنعت، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، دکتر حسن متین همایی؛

e-mail: hasanmatinhamoae@yahoo.com

چکیده

مقدمه: یکی از مشکلات زنان در سنین باروری سندرم پیش از قاعدگی است که از قدرت کافی برای تداخل با جنبه‌های مهم زندگی برخوردار است. از علل ابتلای آن، تغییر هورمون‌های پرولاکتین و سطوح پروستاگلاندین E2 بیان شده است. از این رو هدف این مطالعه، تعیین تاثیر تمرین هوایی و مصرف کورکومین بر این عوامل بود. مواد و روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی، ۴۰ نفر از زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی به ۴ گروه تمرین، کورکومین، تمرین + کورکومین و دارونما تقسیم شدند. گروه‌های تمرینی به مدت ۱۲ هفته و هفتاهای ۳ جلسه تمرین‌های ایروبیک و سایر گروه‌ها از ۷ روز مانده به عادت ماهانه تا ۳ روز اول، روزانه ۲ عدد کپسول، حاوی ۱۰۰ میلی‌گرم کورکومین و یا دارونما مصرف کردند. یافته‌ها: نتایج نشان داد میزان پروستاگلاندین E2 فقط در گروه توام کاهش معنی‌داری داشت ($P=0.05$) و در سایر گروه‌ها تفاوت آماری معنی‌داری دیده نشد ($p>0.1$) (میزان P در گروه‌های تمرین، کورکومین و دارونما به ترتیب 0.04 ، 0.076 و 0.033 به دست آمد). در مورد شاخص پرولاکتین، هیچ کدام از مداخلات تغییر معنی‌داری را در میزان پرولاکتین سرم ایجاد نکردند ($p>0.1$) (میزان P در گروه‌های تمرین، کورکومین، توام و دارونما به ترتیب 0.01 ، 0.076 و 0.025 به دست آمد). نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان داد مصرف کورکومین و انجام تمرین هوایی به صورت هم زمان بعثت کاهش پروستاگلاندین E2 می‌شود. لذا به نظر می‌رسد انجام این دو پروتکل به صورت هم زمان بتواند در درمان سندرم پیش از قاعدگی موثر واقع شود.

واژگان کلیدی: سندرم پیش از قاعدگی، تمرین هوایی، کورکومین، پروستاگلاندین E2، پرولاکتین

دریافت مقاله: ۹۶/۵/۱۸ - دریافت اصلاحیه: ۹۶/۹/۲۷ - پذیرش مقاله: ۹۶/۱۰/۱۶

شماره ثبت در مرکز کارآزمایی بالینی ایران: IRCT2017010331745N1

شناخته می‌شود، حدود ۳ تا ۸ درصد از زنان را در سنین باروری درگیر می‌کند.^۳ نوهیرⁱⁱⁱ (۲۰۱۴) شیوع سندرم پیش از قاعدگی را در کشور مصر ۵/۷۸ درصد و آقازاده (۱۹۹۶) در تهران ۶۰ درصد اعلام کرده‌اند.^{۴,۵} مهم‌ترین علائم PMS شامل دردهای شکمی، ادم، درد سینه‌ها، افسردگی، پرخاشگری و گریه است.^{۶,۷} از علل آن نیز می‌توان افزایش یا کاهش هورمون‌های استروژن و پروژسترون، افزایش پروستاگلاندین E2 و افزایش پرولاکتین را نام برد.^{۷-۹}

مقدمه

سندرم پیش از قاعدگی (PMS)ⁱ شامل علائم منظم روانی و بدنی تکراری است و در مرحله لوتئال سیکل قاعدگی رخ می‌دهد.^{۱,۲} این عارضه در هر ماه تقریباً بیش از ۶ روز فرد را درگیر می‌کند و تاثیر منفی بر زندگی، کار و تحصیل زنان دارد.^۱ علائم خفیف و متوسط حدود ۴ تا ۲۰ درصد و علائم شدید، که با نام اختلال دیسفوریک قاعدگی (PMDD)ⁱⁱ

i- Premenstrual syndrome

ii- Premenstrual dysphoric disorder

iii -Nohair

باعث ایجاد علائم PMS مثل خیز^{viii} و درد پستان^{ix} شود.^{۱۱.۲۲} تمرین منظم هوایی از طریق کاهش سطوح پرولاتکتین، بهبود سلامت فیزیکی و اختلالات خلق باعث بهبود PMS می‌شود.^{۹.۲۲.۳۴} کورکومین نیز دارای اثر سرکوب‌گر بر ترشح پرولاتکتین و خواص ضد افسردگی است و می‌تواند در بهبود PMS، موثر واقع شود.^{۲۱.۲۰}

با توجه به تاثیر عمیق PMS بر زندگی زنان، پژوهش حاضر به بررسی تمرین هوایی و کورکومین بر هورمون پرولاتکتین و PGE2 در زنان مبتلا پرداخته است.

مواد و روش‌ها

در کارآزمایی بالینی تصادفی شده‌ی یک سو کور، پژوهش‌گر با حضور در درمانگاه بیمارستان الزهرا تبریز و با پرسش از مراجعه‌کنندگان ۱۸ تا ۳۵ سال این بیمارستان، ابتدا به صورت شفاهی از وجود یا عدم وجود PMS در افراد مراجعه‌کننده باخبر شد. سپس برای اطمینان از وجود PMS در این افراد، پرسشنامه تشخیص PMS دیکرسون در اختیار ۸۰ نفر از مراجعه‌کنندگان قرار داده شد و از آن‌ها خواسته شد بر اساس ۲ دوره عادت ماهیانه بعدی خود (با توجه به مطالعات انجام گرفته در این زمینه و اعتبار بیشتر تحقیقات آینده‌نگر) این پرسشنامه را تکمیل کنند. به آزمودنی‌ها توضیح داده شد که علائم موجود در این پرسشنامه باید یک هفته مانده به شروع عادت ماهانه شروع شود و حداقل ۳ الی ۴ روز پس از شروع خون‌ریزی از بین بروند. پس از تحلیل اطلاعات موجود در پرسشنامه‌های جمع آوری شده، پژوهش‌گر ۴۰ نفر از زنان سالم غیر فعال و مبتلا به PMS متوسط را انتخاب و به صورت تصادفی به ۴ گروه تمرین (n=۱۰)، کورکومین (n=۱۰)، تمرین+کورکومین (توام) (n=۱۰) و دارونما (n=۱۰) تقسیم کرد. پس از انتخاب آزمودنی‌ها، طی جلسه‌ای تمام مراحل، اقدامات، این بودن دوز دارو و فعالیت‌های ورزشی این پژوهش به تفصیل برای آزمودنی‌ها شرح داده شده و به آن‌ها اطمینان داده شد تمام اطلاعات به دست آمده محترمانه می‌باشد و در اختیار افراد دیگر قرار داده نشده و فقط به صورت کلی گزارش خواهد شد. از تمامی نمونه‌ها جهت شرکت در پژوهش رضایت‌نامه گرفته شد و تمامی آزمودنی‌ها داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند.

viii- Edema
ix -Mastalgia

درمان‌های مختلفی برای بهبود PMS در نظر گرفته می‌شوند^{۷.۱۰} ولی از آنجائی‌که برخی از این درمان‌ها هزینه‌ی بالا و عوارض جانبی زیادی دارند، تمرین‌های هوایی و استفاده از داروهای گیاهی مورد توجه قرار گرفته است.^{۹.۱۱} طبق مطالعات انجام گرفته، فعالیت بدنی شیوه‌ای مناسب در درمان PMS است.^{۱۴}

علی‌آبادی و همکارانش، در مطالعه‌ای تاثیر ورزش مقاومتی و استقامتی را در بهبود سندروم پیش از قاعده‌گی مورد بررسی قرار دادند و اعلام کردند ورزش می‌تواند علائم سندروم پیش قاعده‌گی را کاهش دهد و از این نظر تفاوتی بین ورزش مقاومتی و استقامتی وجود ندارد.^{۱۲} همچنین ترکسیا^۱، در مطالعه‌ی خود، وجود رابطه‌ای معکوس بین میزان فعالیت بدنی و ابتلا به PMS را گزارش کرد.^{۱۳} این در حالی است که کرول^۲، ارتباطی بین PMS و فعالیت بدنی پیدا نکرد.^{۱۰} کورکومین، با نام علمی دیفرولوئیل متان^۳، جزء اصلی و ماده‌ی موثره زرد چوبه و دارای اثرات آنتی‌اکسیدانی و ضد التهابی است و از جمله گیاهانی است که در درمان سندروم پیش از قاعده‌گی موثر شناخته شده است.^{۱۶.۱۷} خیاط و همکارانش در مطالعه‌ای به بررسی تاثیر کورکومین بر بهبود سندروم پیش از قاعده‌گی پرداختند و بیان کردند که کورکومین باعث بهبود علائم PMS می‌شود.^{۱۸} از علائم PMS وجود درد در ناحیه‌ی شکم است که طبق نظر هنزل^۴، می‌تواند ناشی از تجمع پروستاگلاندین E2 (PGE2)^۵ در چند روز پیش از قاعده‌گی باشد.^{۱۲.۱۷} پروستاگلاندینی التهابزا است که طی مسیر سیکلواکسیژناز ساخته می‌شود و با افزایش انقباضات رحمی، باعث بروز PMS می‌شود.^{۱۸.۱۹} تمرین‌های هوایی، از طریق افزایش جریان خون در ناحیه‌ی لگن و رحم، باعث کاهش تجمع PGE2 می‌شوند و علائم PMS را بهبود می‌بخشند.^{۱۲} همچنین، کورکومین ساخت پروستاگلاندین‌ها را از طریق مهار آنزیم سیکلواکسیژناز ۲(COX2)^{vi} کاهش می‌دهند و از این طریق در درمان PMS موثر است.^۷ ووتکه^{vii} افزایش سطوح پرولاتکتین در مرحله لوთال قاعده‌گی را یکی از علل بروز PMS معرفی کرد که می‌تواند از طریق احتباس آب

i- Teixeira

ii- Kroll

iii- Diferuloylmethane

iv - Henzl

v- Prostaglandin E2

vi- Cyclooxygenase 2

vii- Wuttke

بود را از یک هفته مانده به شروع عادت ماهیانه تا ۳ روز پس از شروع خونریزی مصرف کردند. گروه تمرین کورکومین ترکیبی از تمرین ایرووبیک و مصرف کپسول کورکومین طبق دستور ذکر شده را انجام می‌دادند و گروه دارونما نیز ۲ عدد کپسول محتوی ۵۰ میلی‌گرم نشاسته‌ی ذرت را یک هفته مانده به شروع عادت ماهیانه تا ۳ روز بعد از شروع خونریزی مصرف می‌کردند. کلیه کپسول‌ها به رنگ نارنجی و یک اندازه بودند. کپسول‌ها با برچسب ۱ و ۲ به بیماران داده شدند. پس از تحلیل اطلاعات به دست آمده از بیماران، محتویات کپسول‌ها از دکتر داروساز استعلام شد؛ کپسول با کد ۱ حاوی ۱۰۰ میلی‌گرم کورکومین و کپسول شماره ۲ حاوی ۵۰ میلی‌گرم نشاسته‌ی ذرت بود.

سطح هورمون پرولاكتین در این پژوهش به روش ELFA و سطح PGE2 به روش الایزا سنجش شد. با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۱ تحلیل آماری صورت گرفت. در ابتدا توزیع طبیعی داده‌ها توسط آزمون کولموگروف-اسمیرنوف مورد تایید قرار گرفت و سپس از آزمون تحلیل واریانس یک راهه به منظور بررسی احتمالی تفاوت‌های بین گروهی در پیش آزمون استفاده شد. سپس جهت تعیین اثر درون‌گروهی متغیرهای مستقل در طول زمان بر مقدار متغیرهای مورد نظر، از تحلیل واریانس عاملی استفاده شد. در صورت مشاهده تفاوت‌های معنی‌دار بین گروه‌ها جهت تعیین محل تفاوت از آزمون تعقیبی بن فرونی استفاده شد. سطح معنی‌داری برای تمام محاسبات کمتر $P < 0.01$ در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

اطلاعات توصیفی مربوط به آزمودنی‌ها و نرمالیتی داده‌ها در پیش آزمون در جدول ۱ نشان داده شده است. نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که بین ویژگی‌های آزمودنی‌های ۴ گروه در پیش آزمون، تفاوت آماری معنی‌داری وجود ندارد و در نتیجه توزیع تصادفی آزمودنی‌ها به خوبی انجام گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد میزان ۲ PGE2 در هر سه گروه تجربی، کاهش معنی‌داری داشت ($P = 0.001$) (جدول ۲).

معیارهای ورود آزمودنی‌ها عبارت بود از: قرار داشتن در دامنه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال، داشتن قاعده‌گی منظم با دوره‌ی ۲۸ تا ۳۵ روز، ابتلا به PMS متوسط و دارا بودن حداقل ۵ علامت جسمانی بر اساس پرسشنامه‌ی دیکرسون، عدم مصرف داروهای موثر بر سندروم پیش از قاعده‌گی (سینتیک یا طبیعی) در سه ماهه‌ی اخیر و عدم مصرف داروهای هورمونی، ضدتشنج و ضد افسردگی. معیارهای خروج از مطالعه شامل مصرف سیگار و مواد مخدر، عدم شرکت در برنامه‌ی تمرینی بیش از سه جلسه و یا عدم مصرف منظم مکمل، بروز برخی اختلالات اثر گذار بر نتایج مطالعه مانند آسیب دیدگی‌های عضلانی - استخوانی و یا درمان دارویی تداخل‌کننده بر مداخلات اعمال شده توسط پژوهشگر بودند. این مطالعه در کمیته‌ی اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی بررسی شده و با کد IR.SSRI.REC.1395.124 مورد تأیید قرار گرفت. هم‌چنین کد ثبت در سامانه کارآزمایی بالینی IRCT2017010331745N1 است. خون‌گیری از نمونه‌ها در دو نوبت، ابتدای پژوهش، پیش از شروع مداخلات و در فاز لوئیال سیکل قاعده‌گی (روز ۲۵ سیکل قاعده‌گی) و نوبت دوم پس از ۱۲ هفته و انجام مداخلات دوباره روز ۲۵ سیکل قاعده‌گی صورت گرفت. برای سنجش ابتلا به PMS از پرسشنامه‌ی دیکرسون استفاده شد که حاوی ۸ علامت جسمی، ۶ علامت خلقی و ۶ علامت رفتاری است. این پرسشنامه در بسیاری از مطالعات استفاده شده و روایی و پایایی آن مورد تایید است.^۸ در پایان مطالعه، دوباره شدت PMS توسط پرسشنامه دیکرسون سنجیده شد.

برنامه‌ی تمرینی و مصرف مکمل:

گروه تمرین، ۱۲ هفته (هفته‌ای ۳ جلسه) تمرین‌های هوایی (تمرین‌ها ایرووبیک) با شدت متوسط (۵۰ تا ۶۰ درصد ضربان قلب بیشینه) را انجام دادند. ضربان قلب آزمودنی‌ها توسط ساعت مچی ضربان سنج اندازه گرفته شد. تمرین با ۱۰ دقیقه گرم کردن بدن شروع می‌شد، سپس ۴۵ دقیقه فعالیت هوایی ادامه می‌یافت و در انتها با ۵ دقیقه سرد کردن بدن به پایان می‌رسید. افراد گروه کورکومین ۲ عدد کپسول صد میلی‌گرمی کورکومین که پژوهشگر از شرکت دارویی تهیه کرده بود و محتویات کپسول‌ها توسط داروساز پر شده

جدول ۱- نتایج آزمون همگنی در ۴ گروه بر اساس آزمون تحلیل واریانس یک راهه

نتایج تحلیل واریانس		نتایج آزمون لون		گروه				شاخص	
P	مقدار	P	مقدار	آماره آزمون	آماره لون	دارونما	توام	کورکومین	تمرین
۰/۲۴	۱/۴۳	۰/۲۵	۱/۴۴	۲۵/۸۲±۶/۵۹	۲۵/۶۲±۷/۰۷	۲۸/۳۰±۴/۳۷	۲۲/۹۰±۴/۸۱	سن (سال)	
۰/۲۹	۱/۲۹	۰/۴۶	۰/۸۶	۶۴/۲۸±۱۰/۴۸	۶۳/۱۴±۸/۰۴	۵۹/۰۱±۸/۰۲	۵۷/۹۶±۶/۷۹	وزن بدن (کیلوگرم)	
۰/۸۷	۰/۲۳	۰/۲۴	۱/۴۵	۱۶۱/۰۵±۸/۰۷	۱۶۳/۲۲±۴/۸۷	۱۶۲/۲۱±۸/۱۹	۱۶۲/۳۵±۶/۷۵	قد (سانچی متر)	
۰/۱۲	۲/۰۲	۰/۷۱	۰/۴۵	۲۴/۶۴±۲/۵۲	۲۲/۶۲±۲/۳۶	۲۲/۰۴±۳/۵۲	۲۱/۷۰±۲/۶۳	نمایه‌ی توده‌ی بدن (کیلوگرم بر مترمربع)	
۰/۳۹	۱/۰۳	۰/۴۷	۰/۸۵	۱۸۰/۷/۱۱±۲۲۲/۴۲	۱۸۹/۲/۲۳±۲۷۶/۴۰	۱۶۰/۵/۹۱±۳۲۶/۳۲	۱۷۷/۹/۷۳±۳۷۵/۲۳	پروستاگلاندین E2 (پیکوگرم بر میلی لیتر)	
۰/۸۶	۰/۲۴	۰/۰۳۲	۳/۲۷	۲۰/۹۱±۱۴/۶۷	۲۲/۹۴±۱۷/۶۴	۱۹/-۰۸±۷/۷۲	۱۸/۰۵۲±۷/۳۰	پرولاکتین (نانوگرم بر میلی لیتر)	
								(نانوگرم بر میلی لیتر)	

جدول ۲- نتایج لامبادای ویلک تحلیل واریانس عاملی (۲×۲) در مورد تاثیر عامل‌های وضعیت تمرین (تمرین در برابر عدم فعالیت) و وضعیت مصرف مکمل (کورکومین در برابر دارونما) یا اثر تعاملی آن‌ها بر مقدار پروستاگلاندین و پرولاکتین سرم در طول زمان

شاخص	اثر مورد مقایسه	ارزش الامبادا	آماره آزمون	مقدار P
پروستاگلاندین E2 سرم (پیکوگرم بر میلی لیتر)	اثر وضعیت مصرف مکمل در طول زمان	۰/۷۱	۱۴/۵۹	* ۰/۰۰۱
اثر وضعیت تمرین در طول زمان	اثر تعاملی وضعیت مصرف مکمل × وضعیت تمرین در طول زمان	۰/۹۵	۱/۶۸	۰/۲۰
پرولاکتین سرم (نانوگرم بر میلی لیتر)	اثر وضعیت مصرف مکمل در طول زمان	۱/۰۰	۰/۰۰۸	۰/۹۲
اثر وضعیت تمرین در طول زمان	اثر تعاملی وضعیت مصرف مکمل × وضعیت تمرین در طول زمان	۰/۹۹	۰/۰۹	۰/۷۶
اثر وضعیت تمرین در طول زمان	اثر تعاملی وضعیت مصرف مکمل × وضعیت تمرین در طول زمان	۰/۹۳	۲/۷۱	۰/۱۰
		۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۹۹

* تفاوت معنی‌دار <۰/۰۱ p

همچنین، هیچ‌کدام از مداخلات، تغییر معنی‌داری را در میزان پرولاکتین سرم ایجاد نکرد (میزان P در گروه‌های تمرین، کورکومین، توام و دارونما به ترتیب برابر ۰/۰۷۶، ۰/۰۷۶، ۰/۰۹۹ و ۰/۰۲۵). درصد تغییرات پرولاکتین در گروه تمرین ۰/۰۴، در گروه کورکومین ۰/۰۳، در گروه توام ۰/۰۶ و در گروه دارونما ۰/۰۲ به دست آمد که نتایج تغییرات درون گروهی پرولاکتین در جدول ۵ آورده شده است.

درصد تغییرات پروستاگلاندین E2 در گروه تمرین ۰/۱۳ در گروه کورکومین ۰/۰۳ در گروه توام ۲/۶۶ و در گروه دارونما ۱/۴۲ به دست آمد. با این حال، هیچ‌یک از گروه‌ها از لحاظ مقدار اثرگذاری، مزیتی نسبت به هم نداشتند. نتایج تحلیل واریانس در مورد تفاوت‌های بین گروهی پروستاگلاندین E2 معنی‌دار بود و نتایج آزمون تعقیبی محل تفاوت را تنها در گروه توام با دارونما نشان داد (P=۰/۰۰۵). نتایج تغییرات درون گروهی و بین گروهی پروستاگلاندین E2 در جدول ۳ و ۴ آورده شده است.

جدول ۳- نتایج مقایسه‌ی درون‌گروهی داده‌های پیش‌آزمون با پس‌آزمون پروستاگلاندین E2 با استفاده از آزمون تی همبسته

متغیر	گروه	اختلاف متوسط	مقدار P
پروستاگلاندین E2 سرم (پیکوگرم بر میلی لیتر)	تمرین	$۲۱۲/۴۰ \pm ۱۰/۸۵$	* .۰/۰۰۱
کورکومین	کورکومین	$۲۰۳/۰۰ \pm ۱۰/۴/۹۱$	* .۰/۰۰۱
تمرین و کورکومین	تمرین و کورکومین	$۳۶۶/۳۲ \pm ۱۴/۹/۵۱$	* .۰/۰۰۱
دارونما	دارونما	$۱۴۲/۲۸ \pm ۱۷/۱۴$.۰/۳۳

* تفاوت معنی دار درون‌گروهی ($P < 0.01$).

جدول ۴- نتایج تحلیل واریانس خطی در مورد مقایسه‌ی بین گروهی مقدار تغییرات پروستاگلاندین E2 سرم در طول مداخله

متغیر	نتایج آزمون همسانی واریانس(لون)	نتایج تحلیل	نتایج آزمون تعقیبی واریانس	مقدار P	مقایسه در بین	مقدار P	مقدار P	مقدار P	آماره لون
پروستاگلاندین E2 سرم (پیکوگرم بر میلی لیتر)				* .۰/۰۰۳	تمرین با کورکومین	* .۰/۰۹	تمرین با کورکومین	* .۰/۰۰۳	.۰/۷۵
					تمرین با گروه توام	.۰/۸۲	تمرین با گروه توام		.۰/۳۹
					تمرین با دارونما	.۰/۰۴	تمرین با دارونما		
					کورکومین با گروه توام	.۰/۰۵۷	کورکومین با گروه توام		
					کورکومین با دارونما	.۰/۷۶	کورکومین با دارونما		
				* .۰/۰۰۵	گروه توام با دارونما		گروه توام با دارونما		

* تفاوت معنی دار بین گروهی ($P < 0.01$).

جدول ۵- نتایج مقایسه‌ی درون گروهی داده‌های پیش‌آزمون با پس‌آزمون پرولاکتین با استفاده از آزمون تی همبسته

متغیر	گروه	اختلاف متوسط	مقدار P
پرولاکتین سرم (نانوگرم بر میلی لیتر)	تمرین	$۴/۷۳ \pm ۲/۰/۶$.۰/۱
	کورکومین	$۳/۶۲ \pm ۱/۲/۸$.۰/۷۶
	تمرین و کورکومین	$۶/۳۸ \pm ۱/۹/۸$.۰/۹۹
	دارونما	$۰/۶۴ \pm ۰/۲/۳$.۰/۲۵

تفاوت معنی دار دیده نشد ($P > 0.01$).

هوایی و مصرف کورکومین به صورت همزمان باعث کاهش میزان PGE2 در زنان مبتلا شد. اولوریا^۱، در مطالعه‌ی خود تاثیر ورزش هوایی را بر مسیر COX-2 در جهت کاهش LDL مورد سنجش قرار داد. نتایج مطالعه نشان داد تمرین‌های استقامتی از طریق کاهش فعالیت مسیر COX-2 باعث کاهش میزان LDL در موش‌ها می‌شوند.^{۲۰} بنابراین این امکان وجود دارد که فعالیت هوایی از طریق همین مکانیسم باعث کاهش تولید PGE2 و بهبود PMS شود. همچنین نتایج مطالعات نشان می‌دهند که کورکومین قادر به مهار بیان COX-2 و جلوگیری از تبدیل

بحث

یکی از بیماری‌های مهم و شایع که اغلب زنان در سنین باروری با آن دست به گریبان هستند و میزان بروز آن نسبت به گذشته افزایش نشان داده است، سندروم پیش از قاعده‌گی است که سبب اختلال در ارتباطات، مختل شدن فعالیت‌های طبیعی و ایجاد تغییراتی در ویژگی‌های فردی و رفتاری زنان می‌شود.^{۲۱,۲۲} فعالیت بدنی و داروهای گیاهی، از روش‌های درمان این سندروم هستند که به خاطر نداشتن عوارض جانبی، در سال‌های اخیر، مورد توجه بسیاری قرار گرفته‌اند. یکی از علل بروز سندروم پیش از قاعده‌گی، افزایش میزان PGE2 است. در مطالعه‌ی حاضر، انجام تمرین‌های

کورکومین مصرف می‌کنند، عملکرد مغزی بهتر و توانایی‌های شناختی بالاتری دارند.^۲

از محدودیت‌های این پژوهش، کم بودن تعداد نمونه‌ها و عدم کنترل کامل پژوهش‌گر بر نوع و نحوه تغذیه آزمودنی‌ها است. همچنین اعتماد به شرکت‌کنندگان جهت تکمیل پرسشنامه‌ی دیکرسون نیز از دیگر محدودیت‌های این مطالعه است که در این مورد پژوهش‌گر توانست با توضیحات کامل و جامع در مورد علائم سندرم پیش از قاعده‌گی، این محدودیت را تا حدودی کنترل کند. با توجه به کمبود مطالعات در مورد اندازه‌گیری PGE2 در زنان مبتلا به PMS، یکی از نقاط قوت این مطالعه، اندازه‌گیری این ماده به شمار می‌رود. همچنین، مطالعه‌ای وجود ندارد که اثر تمرين هوازی و مکمل کورکومین را در بهبود سندرم پیش از قاعده‌گی مقایسه کرده باشد.

نتایج کلی این مطالعه نشان داد که مصرف کورکومین و انجام تمرين‌های هوازی (به صورت همزمان)، می‌تواند باعث کاهش پروستاگلاندین E2، که یکی از عوامل بروز این سندرم است، شده و ممکن است بتواند در درمان PMS موثر واقع شود. چه بسا، تغییر در پروتکل تمرينی و یا دوز مصرفی کورکومین نتایج متفاوتی را نشان دهد. بنابراین، توصیه می‌شود زنان مبتلا جهت تسکین علائم PMS از هر دو روش به صورت همزمان استفاده کنند.

سپاسگزاری: این مطالعه بخشی از رساله‌ی دکتری در رشته فیزیولوژی ورزشی است که در گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به تصویب رسیده و بدون هیچ‌گونه حمایت مالی انجام گرفته است. بدين‌وسيله از همکاري هيأت بدن‌سازی استان آذربایجان شرقی، مديريت باشگاه اسدی تبريز و كليه‌ی عزيزانی که در انجام اين پژوهش اينجانب را ياري کردن، تشکر و قدردانی می‌کنیم. همچنین نويسندگان مقاله اعلام می‌دارند که هیچ‌گونه تضاد منافعی در پژوهش حاضر وجود ندارد.

i-Circadian rhythms

آراشیدونیک اسید به میانجی‌های التهابی از جمله پروستاگلاندین‌ها است.^{۳۰}

نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات کنعانی و Peake در تعارض بود که علت اصلی این مغایرت می‌تواند متفاوت بودن پروتکل، شدت و مدت تمرين باشد.^{۳۱,۳۲} طبق پژوهش انجام شده توسط مقرنسی، تمرين‌های منظم و طولانی مدت هوازی با شدت متوسط، کاهش معنی‌داری در نشانگرهای التهاب ایجاد می‌کنند، در حالی‌که تمرين‌های بی‌هوازی شدید منجر به افزایش معنی‌دار آن‌ها می‌شوند.^{۳۳} همچنین خیاط، کاهش میزان PGE2 در اثر مصرف کورکومین را از علله بهبود سندرم پیش از قاعده‌گی ذکر کرده است.^{۱۸}

در مطالعه‌ی حاضر، هیچ‌کدام از مداخلات تغییر معنی‌داری را در سطوح پرولاكتین سرم در زنان مبتلا ایجاد نکرد که با نتایج پژوهش‌های ممبني و گائینی همسو است:^{۳۴,۳۵} ولی برخی مطالعات نتایجي مغایر با این پژوهش را گزارش کرده‌اند.^{۳۶,۳۷} تغییر میزان پرولاكتین براساس ریتم شب‌انه‌روزی^۱ می‌تواند یکی از علل بروز این مغایرت باشد.^{۳۸} برخی از پژوهش‌گران نیز، میزان PRL را به صورت حد اندازه‌گیری کرده و یا ورزش مقاومتی را مورد بررسی قرار داده‌اند. از آنجايي‌که استرس روحی و یا جسمی (ورزش و فعالیت بدنی) باعث افزایش رهایش PRL می‌شود،^{۳۶,۴۰} این موارد می‌تواند باعث تفاوت در نتایج شود.

با توجه به نتایج مطالعه‌ی حاضر می‌توان گفت پاسخ‌های هورمونی به تمرين به عواملی چون مدت و نوع تمرين، شدت فعالیت عضلانی، زمینه‌ی ژنتیکی، جنسیت، تغذیه، سن، چرخه‌ی شب‌انه‌روزی و میزان ورزیدگی بستگی دارد.^{۴۱} همچنین، پاسخ به مصرف کورکومین به عواملی مثل دوز مصرف دارو وابسته است.^{۴۲} فعالیت بدنی موجب افزایش کارآیی ذهن، احساس شادابی و سلامت می‌شود و با ایجاد نگرش خوب به زندگی، سلامت روانی فرد را تأمین می‌کند.^{۴۳} نتایج مطالعات نشان داده‌اند افرادی که در زندگی روزمره

References

- Perry M, Judge M, Millar D, McDonald D. An exploratory pilot of factors associated with premenstrual syndrome in minority women. IJNSS 2015; 2: 118-22.
- Tolossa FW, Bekele ML. Prevalence, impacts and medical managements of premenstrual syndrome among

female students: cross-sectional study in college of health sciences, Mekelle University, Mekelle, Northern Ethiopia. BMC Womens Health 2014; 14: 52.

- Ansari S, Dastgheibshirazi H, Sehati F, Sayhi M, Davaridehkordi N. The effect of sole reflexology (Reflex Zone Therapy) on the intensity of premenstrual syn-

- drome: A single-blinded randomized controlled trial. *JCHRONIC* 2014; 3: 32-40.
4. Al-Batanony MA, AL-Nohair SF. Prevalence of Premenstrual Syndrome and Its Impact on Quality of Life among University Medical Students, Al Qassim University, KSA. *JPHRES* 2014; 4: 1-6.
 5. Naeimi N. The Prevalence and Symptoms of Premenstrual Syndrome under Examination. *JBM* 2015; 3: 1-8.
 6. Khajehei M. Aetiology, Diagnosis and Management of Premenstrual Syndrome. *J Pain Relief* 2015; 4: 1-4.
 7. Liu Q, Wang Y, van Heck CH, Qiao W. Stress reactivity and emotion in premenstrual syndrome. *Neuropsychiatr Dis Treat* 2017; 13: 1597-602.
 8. Kamranpour SB, Rahbar T, Farzad L, Alizadeh Sh. The Effect of Valerian extract on the severity of psychological and behavioral symptoms of premenstrual syndrome. *CMJA* 2014; 4: 1012-21. [Farsi]
 9. Ruprai R, Kurwale M, Mankar SH. The effect of regular 4 months aerobic exercises on premenstrual syndrome on healthy females. *IJBAMR* 2015; 4: 340-4.
 10. Darabi F, Rasaie N, Jafarirad S. The Relationship Between Premenstrual Syndrome and Food Patterns in University Student Girls. *JJHRES* 2014; 5: 1-6.
 11. Omidali F. Effect of Pilates Exercise and Extract of Fennel Plant on Symptoms of Premenstrual Syndrome In non-athlete girls. *CMJA* 2015; 2: 1203-13. [Farsi]
 12. Ali abedy H, Neksereshgt A, Tashakoriyani F. The effects of resistance and endurance exercise on physical and psychobehavioral symptoms of pre-menstruation syndrome. *Par J Med Sci* 2014; 12: 9-14. [Farsi]
 13. Teixeira A, Dias M. Relationship between the level of physical activity and premenstrual syndrome Incidence. *Rev Bras Ginecol Obstet* 2013; 35: 210-14.
 14. Sabaei Y, Sabaei S, Khorshidi D, Ebrahimpour S, Fallah-Rostami F. The Association between Premenstrual Syndrome and Physical Activity and Aerobic Power in Female High School Students. *Crescent J Med and Biol Sci* 2015; 2: 53-8.
 15. Kroll AR, Ronnenberg AG, Zagarins SE, Houghton SC, Uebelhoer B, Johnson ER. Recreational Physical Activity and Premenstrual Syndrome in young adult women: A cross-sectional study. *PLOS One* 2017; 12: 1-13.
 16. Sugawara J, Akazawa N, Miyaki A, Choi Y, Tanabe Y, Imai T, et al. Effect of Endurance Exercise Training and Curcumin Intake on Central Arterial Hemodynamics in Postmenopausal Women. *Am J Hypertens* 2012; 25: 651-6.
 17. Henzl MR, Ortega E, Gallegos VC. Prostaglandin E2 and the Luteal Phase of the Menstrual Cycle: Effects on Blood Progesterone, Estradiol, Cortisol and Growth Hormone Levels. *J Clin Endocrinol Metab* 1973; 36: 784-787.
 18. khayat S, kheirkha M, Fanaei H, Behboodi Moghadam Z, pourmohsen M, Kasaeiyan A. Comparison the effects of Ginger and Curcumin in treatment of premenstrual syndrome. *ISMJ* 2015; 18: 575-86.
 19. Choobineh S, Akbarnejhad A, Borjian M, Kordi M. Effect of omega-3 supplementation on serum prostaglandin E2 levels in athlete's women after one Excessive exercise. *Sport Bioscience Research* 2012; 15: 121-33. [Farsi]
 20. Safar Zarei S, Mosalanejad L, Ghobadifar MA. Blood glucose levels, insulin concentrations, and insulin resistance in healthy women and women with premenstrual syndrome: a comparative study. *Clin Exp Reprod Med* 2013; 40:76-82.
 21. Miller M, Chen Sh, Woodliff J, Kansra S. Curcumin (Diferuloylmethane) Inhibits Cell Proliferation, Induces Apoptosis, and Decreases Hormone Levels and Secretion in Pituitary Tumor Cells. *Endocrinology* 2008; 149:4158-67.
 22. Wuttke W, Jarry H, Christoffel V, Spengler B, Wuttke D. Chaste tree (*Vitex agnus-castus*)—pharmacology and clinical indications. *Phytomedicine* 2003; 10: 348-57.
 23. Ying Tsai S. Effect of Yoga Exercise on Premenstrual Symptoms among Female Employees in Taiwan. *Int J Environ Res Public Health* 2016; 13: 1-11.
 24. Powers MB, Asmundson GJ, Smits JA. Exercise for Mood and Anxiety Disorders: The State-of-the Science. *Cogn Behav Ther* 2015; 44: 237-9.
 25. Hurley LL, Akinfiresoye L, Nwulia E, Kamiya A, Kukarni AA, Tizabi Y. Antidepressant-like effects of curcumin in WKY rat model of depression is associated with an increase in hippocampal BDNF. *Behav Brain Res* 2013; 239: 27-30.
 26. Nooh AM, Abdul-Hady A, El-Attar N. Nature and Prevalence of Menstrual Disorders among Teenage Female Students at Zagazig University, Zagazig, Egypt. *J Pediatr Adolesc Gynecol* 2016; 29: 137-42.
 27. Pazoki H, Bolouri G, Farokhi F, Azerbayjani MA. Comparing the effects of aerobic exercise and Foeniculum vulgare on pre-menstrual syndrome. *Middle East Fertility Society Journal* 2015; 20: 1-4.
 28. Mohammadi B, Azamian A, Faramarzi F, Fathollahi F. The Effect of Aerobic Exercise Training and Detraining on Some of the Menstrual Disorders in Non-athlete Students in Lorestan Universities. *Horizon of Medical Science* 2012; 18: 5-11. [Farsi]
 29. Oliveria F, Maifrino L, Jesus G, Juliana G, Carvalho J, Marchon C et al. The role of cyclooxygenase-2 on endurance exercise training in female LDL-receptor knockout ovariectomized mice. *An Acad Bras Cienc* 2013; 85: 1157-64.
 30. Tan X, Poulose EM, Raveendran VV, Zhu BT, Stechschulte DJ, Dileepan KN. Regulation of the expression of cyclooxygenases and production of Prostaglandin I2 and E2 in human coronary artery endothelial cells by Curcumin. *J Physiol Pharmacol* 2011; 62: 21-8.
 31. Kanani M, Nazar Ali P, Hanachi P, Khabiri K. Effect of Taking Omega-3 Supplements and a Six-weeks Anaerobic Exercise Training on Prostaglandin E2 and Inflammatory Enzymes among Young Active Women. *JSUMS* 2016; 23: 344-52. [Farsi]
 32. Peake JM, Hordern K, Gary Wilson G, Coombes K. Plasma cytokine changes in relation to exercise intensity and muscle damage. *Eur J Appl Physiol* 2005; 5: 1-8.
 33. Mogharnasi M, Gaeini A.A, Sheikholeslami Vatani D. Comparing the Effects of Two Training Methods of Aerobic and Anaerobic on some Pre-inflammatory Cytokines in Adult Male Rats. *Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism* 2009; 11: 191-8. [Farsi]
 34. Momabeni A. Effect of severe aerobic exercise on spermatogenesis and reproductive hormones in obese rats. [dissertation]. Arak. Faculty of Literature and Humanities; 2012.
 35. Gaeini AA, Satarifard S, Mohamadi F, Rajaei M. The Effect of a Twelve -Weeks Aerobic Exercise on Ovarian Androgens and Body Composition of Women with Polycystic Ovary Syndrome. *YUMSJ* 2012; 17: 387-97. [Farsi]
 36. Sharifi GH, Babai AR, Barkhordari A, Faramarzi M, Sadeh MR. Effect of a session of exercise up to fatigue on serotonin and prolactin levels in male runners. *Occupational Medicine Quarterly Journal* 2012; 4; 53-8. [Farsi]

37. El-Lithy A, El-Mazny A, Sabbour A, El-Deeb A. Effect of aerobic exercise on premenstrual symptoms, haematological and hormonal parameters in young women. *J Obstet Gynaecol*. 2014; 34: 1-4.
38. Tworoger SS, Missmer SA, Eliassen AH. Physical activity and inactivity in relation to sex hormone, prolactin, and insulin-like growth factor concentrations in premenopausal women - exercise and premenopausal hormones. *Cancer Causes Control* 2007; 18: 743-52.
39. Babai AR, Nodoshan E, Babai E, Jahesh H, Dehnaviyeh R. Effect of a session of bonus exercise up to fatigue on testosterone and Progesteron levels in male runners. *Jssu* 2012; 20: 679-87. [Farsi]
40. Hakkinen K, Pakarinen A, Hannonen P. Effects of strength training on muscle strength, cross-sectional area, maximal electromyographic activity, and serum hormones in premenopausal women with fibromyalgia. *J Rheumatol* 2002; 29: 1287-95.
41. Alae M, Hoseyni SA, Azarbajani MA. The Effect of Resistance Training Course with Saffron Extract on Testosterone, LH and FSH in Rats. *Sport Bioscience Research* 2014; 12: 77-86. [Farsi]
42. Taghadosi M, Mirbagher Ajorpaz N, Torabian M, Sedaghati P. Investigating the Effect of Pilates Exercises on Anxiety in Women with Diabetes type II. *CMJA* 2014; 3: 687-99. [Farsi]

Original Article

The Effect of an Aerobic Training Course and Consumption of Curcumin on Prostaglandin E2 and Prolactin Levels in Women with Premenstrual Syndrome

Zoodfekr L, Matinhomaee H, Tarverdizadeh B

Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Sports Physiology Department, Tehran, I.R. Iran

e-mail: hasanmatinhomaee@yahoo.com

Received: 08/08/2016 Accepted: 06/01/2018

Abstract

Introduction: One of the problems among women of reproductive age is premenstrual syndrome, which often interferes with important aspects of life, including family and social relationships. Among factors influencing this syndrome changes in prolactin and levels of prostaglandin E2 have been documented. The purpose of this study therefore was to determine the effect of aerobic exercise and curcumin consumption on these factors. **Materials and Methods:** In a clinical trial, 40 women with PMS were divided into 4 groups: Exercise, curcumin, training + curcumin and the placebo groups; training groups did aerobic exercise for 12 weeks, (3 times/week), and other groups, consumed 2 capsules containing 100 mg of curcumin or placebo two times day, from 7 days before menstruation until day 3 of its their period. **Results:** Results showed that prostaglandin E2 levels were significantly decreased only in the combination group ($P=0.005$) and while in the other groups there was no significant difference ($p>0.01$); P values in the training, curcumin, and placebo groups were 0.04, 0.76, 0.33 respectively). Also, none of the interventions caused any significant changes in serum levels of prolactin ($p>0.01$), (P values in the training, curcumin, combination and placebo groups were 0.1, 0.76, 0.99 and 0.25 respectively). **Conclusion:** Results of this study showed that taking curcumin and performing aerobic exercise simultaneously reduced the amount of prostaglandin E2, indicating that these two protocols performed simultaneously can be effective in the treatment of premenstrual syndrome.

Keywords: Premenstrual syndrome, Exercise, Curcumin, Prostaglandin E2, Prolactin

IRCT2017010331745N1