

## تأثیر ویتامین E بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانتی پلاسمای پراکسیداسیون لیپیدی و نفروپاتی ناشی از دیابت در رت

علیرضا شیرپور، دکتر علی تقی‌زاده افشاری، دکتر امیر عباس فرشید، دکتر عبدالامیر علامه، یوسف رسمی،  
دکتر حسین مغانچی‌زاده، دکتر مجتبی کریمی‌پور، رامین سعادتیان، ابوالفضل دادخواه تهرانی

### چکیده

**مقدمه:** در این مطالعه تأثیر ویتامین E بر نفروپاتی ناشی از دیابت، ظرفیت آنتی‌اکسیدانتی پلاسمای پراکسیداسیون لیپیدها مورد بررسی قرار گرفت. **مواد و روش‌ها:** ۲۴ رأس رت نر نژاد وستار با میانگین وزنی  $۲۵۰\pm۲۰$  گرم انتخاب شدند. ۱۶ قطعه از رت‌ها با تزریق استریتوزوتوسین (۶۰ میلی‌گرم بر کیلو‌گرم) دیابتی شدند. رت‌ها به سه گروه ۸ تابی شامل گروه غیردیابتی، دیابتی درمان نشده و دیابتی درمان شده با روزانه ۳۰۰ میلی‌گرم ویتامین E تقسیم شدند. بعد از ۸ هفته تمام رت‌ها با هیدرات کلرال بیهوش شدند. پس از خونگیری کلیه‌ها برداشته شدند و در فرمالین بافری ۱۰٪ قرار گرفتند. پلاسمای و گلبول‌های قرمز نمونه‌های خونی از هم جدا شدند. ظرفیت آنتی‌اکسیدانتی پلاسمای روشن FRAP و میزان مالون دی‌آلید (MDA) به عنوان شاخص پراکسیداسیون چربی‌ها مورد سنجش قرار گرفتند. نمونه‌های کلیوی از نظر تغییرات ساختمان گلومرولی و توبولی و پرولیفراسیون سلول‌های فوکال مورد مطالعه قرار گرفتند. **یافته‌ها:** در موش‌های سالم، دیابتی و دیابتی درمان شده با ویتامین E میزان MDA به ترتیب  $۱۲۶/۱۴\pm۶/۶$ ،  $۲۴۵/۲\pm۱۷$  و  $۱۷۰/۸\pm۹$  نانومول بر گرم هموگلوبین بود. در گروه دیابتی درمان شده با ویتامین E کاهش معنی‌دار میزان MDA نسبت به گروه دیابتی درمان نشده نشان‌گر کاهش پراکسیداسیون لیپیدها در این گروه است ( $p<0.01$ ). ظرفیت آنتی‌اکسیدانتی نیز در سه گروه ذکر شده به ترتیب  $۸۰.۸/۷\pm۳۰.۵/۸$  و  $۵۸.۶/۲\pm۲۳.۷/۹$  میلی‌مول در لیتر بود. ظرفیت آنتی‌اکسیدانتی پلاسمای در گروه درمان شده با ویتامین E نسبت به دو گروه اول افزایش معنی‌دار نشان داد ( $p<0.05$ ). در موش‌های دیابتی درمان نشده پرولیفراسیون منتشر گلومرولی و تورم سلولی منتشر و تغییرات هیالینه مشاهده شد. همچنین دیواره عروق ضخیم می‌باشد. این تغییرات در رت‌های تحت درمان با ویتامین E تخفیف محسوس نشان دادند. **نتیجه‌گیری:** نتایج این مطالعه نشان داد که ویتامین E به عنوان یک آنتی‌اکسیدانت سبب کاهش اثرات استرس اکسیداتیو و بهبود نفروپاتی ناشی از دیابت می‌شود.

**واژگان کلیدی:** دیابت، نفروپاتی، استرس اکسیداتیو، ویتامین E، آنتی‌اکسیدانت

دریافت مقاله: ۸۴/۶/۱۲ - دریافت اصلاحیه: ۸۴/۸/۲۵ - پذیرش مقاله: ۸۴/۸/۲۸

کنده‌ی ناهنجاری‌ها در حالت عام - و در دیابت به طور خاص - به شمار می‌روند. در سال‌های اخیر معلوم شده است که در سندروم دیابت پراکسیداسیون لیپیدی بالا رفت و

**مقدمه**  
امروزه رادیکال‌های آزاد به عنوان یک عامل مهم ایجاد

پیشنهاد شده است که فعالیت PK<sub>C</sub> گلومرولی ممکن است سبب تشدید پراکسیداسیون لیپیدی نیز شود.<sup>۳</sup> در این مطالعه ما در صدد آن هستیم تا تأثیر ویتامین E را به عنوان یک آنتی اکسیدانت بر ظرفیت آنتی اکسیدانتی پلاسماء، پراکسیداسیون لیپیدی و نفروپاتی کلیوی در رت‌های دیابتی مورد مطالعه قرار دهیم.

## مواد و روش‌ها

حیوانات مورد مطالعه ۲۴ رأس رت نر نژاد وستار با میانگین وزنی  $250 \pm 20$  گرم تهیه شده از مرکز نگهداری حیوانات آزمایشگاهی دانشکده پزشکی ارومیه بودند.<sup>۱۶</sup> رأس از رتها با تزریق زیر صفاقی استرپتوزوتوسین (sigma)  $60$  میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دیابتی شدند.<sup>۱۲</sup> به این ترتیب که  $48$  ساعت بعد از تزریق STZ رتها بیان کلوز خون آنها از  $300$  mg/dL بالاتر بود، به عنوان رتها دیابتی در نظر گرفته شدند. به رت نیز به همان مقدار محلول نرمال سالین تزریق شد. رتها به  $3$  گروه  $8$  تایی شامل گروه شاهد غیر دیابتی (ND)، گروه دیابتی درمان نشده (DNT) و گروه دیابتی درمان شده با ویتامین E به مقدار روزانه  $300$  میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن همراه با آب آشامیدنی (D+VE) تقسیم شدند. تمام حیوانات در شرایط دمایی  $25 \pm 2$  درجه‌ی سانتی‌گراد و دوره‌های روشنایی و تاریکی  $12$  ساعته نگهداری می‌شدند. بعد از  $8$  هفتگه، رتها با تزریق زیر صفاقی داروی بیوهشی هیدراتکلرال  $10\%$   $5$  سی‌سی به ازای هر  $100$  گرم وزن بدن بیوهش شدند. از قلب هر رت  $3$  سی‌سی خون به وسیله‌ی سرنگ گرفته شد. نمونه‌های خونی با ماده‌ی ضد انعقاد EDTA مخلوط و با دور  $g$   $3000$  به مدت  $10$  دقیقه سانتریفوژ شدند. گلوبول قرمز و همچنین  $2$  نمونه  $0/5$  سی‌سی پلاسما جهت اندازه‌گیری مالون دی آلدئید و ظرفیت آنتی اکسیدانتی پلاسما جدا شده، در دمای  $-70$  درجه‌ی سانتی‌گراد نگهداری شدند. سپس محفظه شکم باز و کلیه‌ها برداشته شدند و پس از وزن کردن، کلیه‌ها به قطعات کوچک تقسیم و در محلول نرمال سالین شستشو و همچنین در محلول بافری فرمالین  $10\%$  جهت آزمایش‌های پاتولوژی قرار گرفتند.

نمونه‌های کلیوی حداقل بعد از  $48$  ساعت قرار گرفتن در محلول فرمالین، پس از طی مراحل پردازش بافتی با روش

این افزایش در آسیب بافتی تحت شرایط دیابتی شرکت می‌کند.<sup>۱-۳</sup> همچنین نشان داده شده است که در حالت دیابتی، استرس اکسیداتیو ناشی از رادیکال‌های آزاد به طور معنی‌داری، سبب کاهش مکانیسم‌های آنتی اکسیدانتی می‌شود و طبق تئوری سریل<sup>۱</sup> هیپرگلیسمی یک فاکتور اساسی برای استرس اکسیداتیو است.<sup>۳</sup> در سمیت گلوز به عنوان یک مونوساکارید، اتو اکسیداسیون ممکن است یکی از منابع تولید شکل‌های فعال اکسیژن (ROS) باشد.<sup>۵</sup> همچنین مطالعه‌ها نشان دادند که انواع فعال نیتروژن (RNS) نیز در دیابت افزایش و دفاع آنتی اکسیدانتی کاهش یافته، در نهایت در حالت دیابت کنترل نشده سبب سوء عملکرد آندوتیال عروقی و اعصاب عروقی می‌شود.<sup>۷,۸</sup> رادیکال‌های آزاد در شرایط معمولی نیز در بدن به طور اجتناب‌ناپذیر در اثر واکنش‌های خود به خود مانند اکسیداسیون آدرنالین، دوپامین و غیره تولید می‌شود.<sup>۸</sup> در مقابل این مواد تخریب‌گر، ارگانیسم‌های زنده یک شبکه مرکب آنتی اکسیدانتی بر علیه رادیکال‌های آزاد تولید می‌کنند.

آنتی اکسیدانت‌هایی مانند آلبومین، گلوتاتیون احیا شده (GSH)، آسکوربیک اسید، آلفا توکوفرول،  $\beta$  کاروتون، اوریک اسید، بیلی‌روبین و فلاونوئیدها<sup>۹</sup> از اشکال (aspect) اساسی این شبکه هستند.<sup>۹</sup> این مواد رادیکال‌های آزاد را حذف و از اثر تخریبی آنها جلوگیری می‌کنند. در شرایط تندرستی تعادلی میان رادیکال‌های آزاد و دفاع آنتی اکسیدانتی وجود دارد. استرس اکسیداتیو وقتی روی می‌دهد که این تعادل به نفع رادیکال‌های آزاد به هم بخورد.<sup>۱۰</sup> در اصل استرس اکسیداتیو در اثر افزایش ROS/RNS و کاهش دفاع آنتی اکسیدانتی روی می‌دهد که هر دو در اثر هیپرگلیسمی به وجود می‌آیند.<sup>۱۱</sup> همچنین روند گلیکاسیون غیر آنزیماتیک پروتئین‌ها و مسیر پلی‌بول<sup>iii</sup> نیز منشای رادیکال‌های آزاد در مرحله‌ی هیپرگلیسمی است.<sup>۵</sup> روند متابولیسم گلوز در مسیر پلی‌بول یک محرك اساسی است که نسبت NADH/NAD<sup>+</sup> را افزایش می‌دهد و همچنین سبب افزایش درون سلولی پروتئین کیناز C (PK<sub>C</sub>) مؤثر بر دی‌آسیل گلیسرول می‌گردد. معلوم شده است که گلومرول‌های کلیوی حساسیت ویژه‌ای به استرس اکسیداتیو ناشی از PK<sub>C</sub> دارند. با توجه به افزایش فعالیت PK<sub>C</sub> گلومرولی در هیپرگلیسمی،


i- Ceriell

ii- Flavonoids

iii- Polyol Pathway

بود، در موش‌های دیابتی درمان نشده میزان MDA به  $245 \pm 24$  نانومول بر گرم هموگلوبین رسید که در مقایسه با گروه اول افزایش معنی‌دار است ( $p < 0.05$ ). در رت‌های درمان نشده با ویتامین E میزان MDA کاهش نشان داد و به  $170 \pm 17$  نانومول بر گرم هموگلوبین رسید. این مقدار در مقایسه با گروه دیابتی درمان نشده کاهش معنی‌دار دارد ( $p < 0.05$ ).

**ظرفیت آنتیاکسیدانتی پلاسمای ظرفیت آنتیاکسیدانتی پلاسمای** در رت‌های غیردیابتی، دیابتی درمان نشده، و دیابتی درمان شده با ویتامین E به ترتیب  $23 \pm 22$ ،  $58.2 \pm 7.9$ ، و  $58.6 \pm 5.8$  میلی‌مولار در لیتر بود. ظرفیت آنتیاکسیدانتی پلاسمای در رت‌های درمان شده با ویتامین E نسبت به دو گروه دیابتی درمان نشده و سالم افزایش معنی‌دار ( $p < 0.05$ ) نشان داد (نمودار ۲).




نمودار ۲- تغییرات ظرفیت آنتیاکسیدانتی پلاسمای در گروه‌های مورد مطالعه (ND): رت‌های سالم (کنترل)، NTD: رت‌های دیابتی درمان نشده، VETD: رت‌های دیابتی درمان شده با ویتامین (E)

**وزن بدن و وزن کلیه‌ها:** جدول ۱ تغییرات وزن بدن و وزن کلیه‌ها را در گروه‌های مختلف مورد آزمایش نشان می‌دهد. همان‌طور که از جدول مشاهده می‌شود، وزن بدن در رت‌های دیابتی درمان نشده در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی‌داری را نشان داد. کاهش وزن در رت‌های دیابتی درمان شده با ویتامین E نیز با گروه کنترل اختلاف معنی‌دار داشت ( $p < 0.03$ ). در رت‌های دیابتی درمان نشده وزن کلیه‌ها در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی‌دار نشان داد ( $p < 0.03$ ). در رت‌های دیابتی درمان شده با ویتامین E وزن کلیه‌ها در مقایسه با گروه کنترل اختلاف معنی‌دار نشان

هماتوکسیلین - ائورزین (H&E) رنگ‌آمیزی شدند. لامهای تهیه شده با میکروسکوپ نوری از نظر تغییرات ایجاد شده مورد بررسی قرار گرفتند.

میزان مالون دی‌آلدئید به روش اسپکتروفتومتری و بر اساس اندازه‌گیری غلظت ترکیب صورتی رنگ کروموزن صورت گرفت. وقتی که مالون دی‌آلدئید با اسید تیوباربیتوریک ترکیب شود، این ماده تشکیل می‌گردد. واحد اندازه‌گیری مالون دی‌آلدئید نانومول بر گرم هموگلوبین (nmol/grHb) است.<sup>۱۳</sup>

ظرفیت آنتیاکسیدانتی پلاسمای به روش FRAP (قدرت آنتیاکسیدانتی احیایی آهن) به شرح زیر اندازه‌گیری شد: مقدار  $3000$  میلی‌مولار از بافر استات با  $pH=4$ ، مقدار  $10$  میلی‌مولار از محلول  $246$  تری پیریدیل S (TPTA) در اسید کلریدریک  $40$  میلی‌مولار و  $20$  میلی‌مولار  $FeCl_3$  به نسبت  $10$  به  $1$  به عنوان FRAP با  $25$  میکرولیتر هفتصد و پنجاه میکرولیتر از معرف FRAP با  $25$  میکرولیتر پلاسمای در یک لوله آزمایش مخلوط شد. پس از  $10$  دقیقه انکوباسیون در دمای اطاق، جذب محلول‌ها در  $593$  نانومتر اندازه‌گیری شدند.<sup>۱۴</sup> تغییرات جذب مستقیماً به شدت احیا کننده‌گی کل الکترون‌دهی آنتیاکسیدانت‌های موجود در مخلوط بستگی دارد. برای آنالیز آماری داده‌ها از برنامه آماری SPSS تحت ویندوز و آزمون آماری t استفاده شد و  $p < 0.05$  به عنوان تغییرات معنی‌دار تلقی شد.



نمودار ۱- تغییرات میزان مالون دی‌آلدئید (MDA) در گروه‌های مورد مطالعه (ND): رت‌های سالم (کنترل)، NTD: رت‌های دیابتی درمان نشده، VETD: رت‌های دیابتی درمان شده با ویتامین (E)

## یافته‌ها

نمودار یک تغییرات میزان مالون دی‌آلدئید را در گروه‌های مورد مطالعه نشان می‌دهد. میزان مالون دی‌آلدئید در رت‌های سالم  $14 \pm 6$  نانومول بر گرم هموگلوبین

جدول ۱- تغییرات وزن بدن و وزن کلیه در گروه‌های مورد مطالعه

گروه دیابتی درمان شده با ویتامین E	گروه دیابتی درمان نشده	گروه کنترل
$۱۸۷ \pm ۱۲/۹^*$	$۲۱۵ \pm ۷/۷^*$	$۲۵۰ \pm ۲۰$
$۷۷۰ \pm ۲۰^{\ddagger}$	$۹۱۰ \pm ۲۹^{\ddagger}$	$۷۵۰ \pm ۲۲$

اعداد نشان‌دهنده میانگین ( $\pm$  خطای معیار) است. \*:  $p < 0.003$ ;  $^{\ddagger}: p < 0.02$ ;  $^{\ddagger}: p < 0.01$ .


نداد ( $p < 0.03$ ) اما وزن کلیه‌ها در این گروه رت‌ها نسبت به دیابتی درمان نشده کاهش معنی‌دار نشان داد ( $p < 0.01$ ). تصویر ۱ تغییرات توبولی و گلومرولی ایجاد شده در گروه‌های مختلف را نشان می‌دهد. همان‌طور که قسمت «ب» تصویر نشان می‌دهد، در رت‌های دیابتی درمان نشده افزایش ماتریکس مزانژیال و پرولیفراسیون گلومرولی منتشر که موجب پرسیدن فضای کپسول بومن و چسبندگی شبکه مویرگی به دیواره شده است، دیده می‌شود. تصویر بعضی از گلومرول‌ها نشان‌دهنده تغییرات دژنرانس واکولار بیشتر در ناحیه دیستال بود. همچنین ضخیم شدن دیواره عروق نیز دیده شد که همراه با هیالینه شدن است. قسمت «ج» تصویر ۱ هیستولوژی کلیه رت دیابتی درمان شده با ویتامین E را نشان می‌دهد. تمام تغییرات ذکر شده در بالا در رت‌های دیابتی درمان شده کاهش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌داد.

## بحث

مرور مجدد نتایج مطالعه‌ی ما نشان می‌دهد که ویتامین E به عنوان یک آنتی‌اکسیدانت سبب کاهش پراکسیداسیون لیپیدی، افزایش ظرفیت آنتی‌اکسیدانتی پلاسمما و تخفیف نفروپاتی ناشی از دیابت می‌شود.

مطالعه‌ها چندی نشان‌دهنده حضور پراکسیداسیون لیپیدی و استرس اکسیداتیو در دیابت است.<sup>۱۵,۱۶</sup> استرس اکسیداتیو حتی قبل از شروع علائم دیابت افزایش می‌یابد. در دیابت قندی به نظر می‌رسد که استرس اکسیداتیو هم به وسیله‌ی افزایش ROS و هم کاهش دفاع آنتی‌اکسیدانتی و تغییر در وضعیت احیایی<sup>i</sup> سلولی حاصل می‌شود.<sup>۱۷</sup>

هیپرگلیسمی در دیابت قندی نه تنها سبب افزایش ROS می‌شود، بلکه موجب تضعیف مکانیسم‌های آنتی‌اکسیدانتی از



تصویر ۱- تغییرات توبولی و گلومرولی در گروه‌های مختلف مورد مطالعه. الف- رت سالم (کنترل); ب- رت دیابتی درمان نشده؛ و ج- رت دیابتی درمان شده با ویتامین E

TGF- $\beta_1$  نیز سبب افزایش سنتز پروتئین در ماتریکس خارج سلولی و مکانیسم پرولیفراسیون سلولی می‌شود.<sup>۲۳-۲۶</sup> و این نیز منجر به افزایش اندازه کلیه و وزن آن در رتهای دیابتی می‌شود. مطالعه‌ها متعددی نشان داده‌اند که مصرف یک آنتیاکسیدانت مانند ویتامین C، تورین و N استیل - سیستین<sup>۱۷</sup> می‌تواند فعالیت TGF- $\beta_1$  و افزایش سنتز پروتئین‌های ماتریکس و هیپرتروفی کلیه را متوقف کند.<sup>۲۷-۲۹</sup> در مطالعه‌ی ما نیز وزن کلیه‌ها در رتهای درمان شده با ویتامین E در مقایسه با رتهای دیابتی درمان نشده کاهش معنی‌داری نشان داد. ویتامین E به علت حلالیت بسیار بالا در چربی، آنتیاکسیدانت اصلی غشاء سلول و لیپوپروتئین‌ها عمل می‌کند. مطالعه‌ها متعدد نشان داده‌اند که مصرف ویتامین E با جلوگیری از اکسیداسیون اسیدهای چرب اشباع نشده غشاء سلول، از آسیب غشا جلوگیری و با تثبیت غشا، آن را مستعد برای تداخل عمل با انسولین می‌کند.<sup>۳۰-۳۱</sup> به عبارت دیگر ویتامین E در شرایط فیزیولوژیک به عنوان یک آنتیاکسیدانت مهم چربی دوست در غشاء سلول و لیپوپروتئین‌های پلاسمما عمل می‌کند و از پراکسیداسیون لیپیدی و تشکیل AGE<sup>v</sup> جلوگیری می‌کند. علاوه بر این ویتامین E اثرات آنتیپرولیفراسیونی در سلول‌های مزانژیال کشت داده شده نیز نشان داده است.<sup>۳۲</sup> معلوم شده است که ویتامین E توانایی مهار تشکیل TGF- $\beta_1$  در گلومرول‌های کلیوی از طرق کاهش فعالیت PK<sub>C</sub> می‌شود. با در نظر گرفتن این که در دیابت سیستم آنتیاکسیدانتی و ویتامین‌های E و C کاهش می‌یابد.<sup>۳۳</sup> به نظر می‌رسد که این کاهش ویتامین و غلظت آنتیاکسیدانتی در پلاسمای موش‌های رت یک نقش اساسی را در پیشرفت استرس اکسیدانتیو سیستمیک در دیابت و نفروپاتی دیابتی ناشی از رادیکال‌های آزاد می‌شود.<sup>۳۴</sup> در مطالعه‌ی ما مصرف ویتامین E سبب کاهش پراکسیداسیون لیپیدی و افزایش ظرفیت آنتیاکسیدانتی شد. مطالعه‌ها دیگر نیز گزارش کردند که مصرف یک آنتیاکسیدانت در بیماران دیابتی و دیابت‌های تجربی اثرات مفید در متابولیسم گلوگز داشته، سبب کاهش گلیکاسیون پروتئینی و کاهش شدت استرس اکسیدانتیو و بهبود عملکرد سلول‌های آندوتیال می‌شود.<sup>۳۴-۳۵</sup> مطالعه‌ها انجام شده به وسیله مولینیوکس، و کراون و همکاران نیز

طریق گلیکاسیون آنزیمه‌ای رفتگر<sup>i</sup> می‌گردد. ارتباط بین نفروپاتی دیابتی و استرس اکسیدانتیو بر پایه‌ی مشاهدات زیر بنا گذاشته شده است:

- ۱- افزایش پراکسیداسیون لیپیدی و ۸- هیدروکسی داکسی گوانوزین<sup>ii</sup> در تمامی رتهای دیابتی دیده می‌شود.
  - ۲- افزایش گلوگز به طور مستقیم سبب افزایش استرس اکسیدانتیو در سلول‌های مزانژیال گلومرولی - که سلول‌های هدف در نفروپاتی کلیوی هستند - می‌شود.
  - ۳- افزایش بیان زن مربوط به TGF- $\beta_1$  و فیبرونکتین در اثر استرس اکسیدانتیو در دیابت (زن‌های دخیل در آسیب گلومرولی در دیابت) دیده می‌شوند.
  - ۴- مهار استرس اکسیدانتیو سبب بهبود تمامی ناهنجاری‌های مرتبط با نفروپاتی دیابتی می‌شوند.<sup>۱۸</sup>
- نتایج مطالعه‌ی ما تأییدی بر نتایج مطالعه‌ی ها و کیم می‌باشد.<sup>۳</sup> آنها مشاهده کردند که در دیابت قندی پراکسیداسیون لیپیدی در پلاسمما افزایش می‌یابد. نویسنگان مشابه نیز نشان دادند که هیپرگلیسمی سبب افزایش پراکسیداسیون لیپیدی می‌شود.<sup>۱۹</sup> افزایش گلوگز سبب فعال شدن سیستم PK<sub>C</sub> می‌شود احتمال داده شده است که افزایش PK<sub>C</sub> سبب شروع استرس اکسیدانتیو در گلومرول‌های کلیوی در مرحله‌ی آغازین دیابت می‌شود. در حالی که عوامل دیگر مانند اتواکسیداسیون گلوگز، مسیر پلی‌یول و گلیکاسیون نقش اصلی را در مراحل بعدی آسیب‌های پراکسیداسیون دارند.<sup>۲۰</sup> افزایش پروتئین کنیاز C سبب بالا رفتن فعالیت آنزیم فسفولیپاز A<sub>2</sub> (PLA<sub>2</sub>) A<sub>2</sub> (PLA<sub>2</sub>) می‌شود.<sup>۲۱-۲۲</sup> فعالیت PLA<sub>2</sub> سبب تشکیل اسید آراشیدونیک شده، این منجر به افزایش پروستاگلاندین‌ها می‌شود. پروستاگلاندین‌ها منبع شناخته شده‌ای برای رادیکال‌های آزاد هستند. رادیکال‌های آزاد و PK<sub>C</sub> از طرق مختلف می‌توانند سبب آسیب کلیوی در دیابت شوند. اولاً رادیکال‌های آزاد با تخریب اسیدهای چرب غیر اشباع چند زنجیره PUFA<sup>iii</sup> در بیوسنتز لیپیدها اختلال ایجاد می‌کنند که از مشخصه‌های ناهنجاری‌های دیابتی است.<sup>۲۳</sup> ثانیاً پیامد لیپید پراکسیداسیون، افزایش رادیکال‌های آزاد سبب افزایش PK<sub>C</sub> می‌شود. افزایش PK<sub>C</sub> سبب افزایش TGF- $\beta_1$  شده و

i- Scavenger

ii- 8-hydroxy deoxy guanosine

iii- Poly unsaturated Fatty acids

می‌یابد و همچنین سبب کاهش  $PK_C$  می‌شود.<sup>۳۳</sup> به نظر می‌رسد، کاهش نفروپاتی در اثر مصرف ویتامین E ناشی از همودینامیک مناسب کلیه در رتهای درمان شده با ویتامین E باشد. با توجه به مطالب بالا به نظر می‌رسد که تولید رادیکال‌های آزاد به صورت یک مکانیسم مثبت به تدریج شیوع علایم مختلف دیابت از جمله نفروپاتی را سبب می‌شود. گرچه رفع علت اصلی بروز چنین ناهنجاری‌هایی یعنی علت بروز دیابت راه چاره اصلی است ولی تا حال هیچ روش مطمئن و صد درصد برای جایگزینی نقش اصلی انسولین توسط عوامل سنتتیک و یا درمان قطعی عوارض و ناهنجاری‌های دیابتی ارایه نشده است. استفاده از ترکیبات غذایی و تغییر رژیم غذایی برای جلوگیری از بروز برخی علایم موردن توجه کانونی مطالعه‌ها است. اگرچه پاتولوژی ایجاد تغییرات کلیوی در دیابت مختلف و متفاوت است ولی برای کاهش اثرات آنها استفاده از رژیمهای غذایی غنی شده از ویتامین E و دیگر آنتی‌اکسیدانت‌ها می‌تواند یکی از روش‌های محدود کننده اثرات دیابت باشد.

نشان داد که مصرف ویتامین E و تروولوكس (آنالوگ هیدروفیلیک آلفا توکوفرول) سبب کاهش ضخامت غشاء پایه و آسیب بافتی ناشی از دیابت و همچنین سبب کاهش پراکسیداسیون لیپیدی می‌شود.<sup>۳۶-۳۹</sup>

گروهی نیز کاهش جریان خون کلیوی را در دیابت علت نفروپاتی کلیوی می‌دانند. مکانیسم این اثر احتملاً از طریق افزایش فعالیت آنزیم  $PLA_2$  می‌باشد. این آنزیم که در اثر بالا رفتن فعالیت  $PK_C$  تولید می‌شود<sup>۲۰-۲۱</sup> باعث تشکیل پروستاسیکلین I2 (PGI2) و ترومبوکسان A2 (TXA2) می‌گردد. PGI2 گشاد کننده عروقی و TXA2 منقبض کننده عروقی است و تعادل بین آنها در شرایط طبیعی موجب حفظ حالت طبیعی در تون عروقی می‌شود. مشخص شده است که در دیابت میزان TXA2 افزایش و میزان PGI2 کاهش می‌یابد،<sup>۳۷</sup> به هم خوردن تعادل بین TXA2 و PGI2 منجر به کاهش جریان خون می‌شود و در بعضی از اندازها از جمله کلیه متعاقب کاهش جریان خون بروز نفروپاتی افزایش می‌یابد.<sup>۳۷</sup> با توجه به اینکه در اثر مصرف ویتامین E ظرفیت آنتی‌اکسیدانتی بالا رفته و لیپید پراکسیداسیون کاهش

## References

- Nourooz-Zadeh J, Rahimi A, Tajaddini-Sarmadi J, Tritschler H, Rosen P, Halliwell B, et al. Relationships between plasma measures of oxidative stress and metabolic control in NIDDM. *Diabetologia* 1997; 40: 647-53.
- Hunt JV, Wolff SP. Oxidative glycation and free radical production: a causal mechanism of diabetic complications. *Free Radic Res Commun* 1991; 12-13 Pt 1:115-23.
- Ha H, Kim KH. Role of oxidative stress in the development of diabetic nephropathy. *Kidney Int Suppl* 1995; 51: S18-21.
- Ceriello A, Quatraro A, Giugliano D. Diabetes mellitus and hypertension: The possible role of hyperglycemia through oxidative stress. *Diabetologia* 1993; 36: 265-266.
- Wolf G, Thaiss F. Hyperglycaemia--pathophysiological aspects at the cellular level. *Nephrol Dial Transplant* 1995; 10: 1109-12.
- Jakus V. The role of free radicals, oxidative stress and antioxidant systems in diabetic vascular disease. *Bratisl Lek Listy* 2000; 101: 541-51.
- van Dam PS, Bravenboer B, van Asbeck BS, van Oirschot JF, Marx JJ, Gispert WH. Effects of insulin treatment on endoneurial and systemic oxidative stress in relation to nerve conduction in streptozotocin-diabetic rats. *Eur J Clin Invest* 1996; 26: 1143-9.
- Halliwell B. Vitamin E and the treatment and prevention of diabetes: a case for a controlled clinical trial. *Singapore Med J* 2002; 43: 479-84.
- Prior RL, Cao G. In vivo total antioxidant capacity: comparison of different analytical methods. *Free Radic Biol Med* 1999; 27: 1173-81.
- Yu BP. Cellular defenses against damage from reactive oxygen species. *Physiol Rev* 1994; 74: 139-62.
- Uchimura K, Nagasaka A, Hayashi R, Makino M, Nagata M, Kakizawa H, et al. Changes in superoxide dismutase activities and concentrations and myeloperoxidase activities in leukocytes from patients with diabetes mellitus. *J Diabetes Complications* 1999; 13: 264-70.
- Melhem MF, Craven PA, Liachenko J, DeRubertis FR. Alpha-lipoic acid attenuates hyperglycemia and prevents glomerular mesangial matrix expansion in diabetes. *J Am Soc Nephrol* 2002; 13: 108-16.
- Stocks J, Offerman EL, Modell CB, Dormandy TL. The susceptibility to autoxidation of human red cell lipids in health and disease. *Br J Haematol* 1972; 23: 713-24.
- Benzie IF, Strain JJ. The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of "antioxidant power": the FRAP assay. *Anal Biochem* 1996; 239: 70-6.
- Keaney JF Jr, Loscalzo J. Diabetes, oxidative stress, and platelet activation. *Circulation* 1999; 99: 189-91..
- Haffner SM. Clinical relevance of the oxidative stress concept. *Metabolism* 2000; 49(2 Suppl 1): 30-4. 17.
- West IC. Radicals and oxidative stress in diabetes. *Diabet Med* 2000; 17: 171-80.
- Ha H, Kim KH. Pathogenesis of diabetic nephropathy: the role of oxidative stress and protein kinase C. *Diabetes Res Clin Pract* 1999; 45:147-51.
- Ha H, Yoon SJ, Kim KH. High glucose can induce lipid peroxidation in the isolated rat glomeruli. *Kidney Int* 1994; 46: 1620-6.

20. Derubertis FR, Craven PA..Activation of protein kinase C in glomerular cells in diabetes. Mechanisms and potential links to the pathogenesis of diabetic glomerulopathy. *Diabetes* 1994;43:1-8.
21. DeRubertis FR, Craven PA. Eicosanoids in the pathogenesis of the functional and structural alterations of the kidney in diabetes. *Am J Kidney Dis* 1993; 22: 727-35.
22. Torres MD, Canal JR, Perez C. Oxidative stress in normal and diabetic rats. *Physiol Res* 1999; 48: 203-8.
23. Border WA, Yamamoto T, Noble NA. Transforming growth factor beta in diabetic nephropathy. *Diabetes Metab Rev* 1996; 12: 309-39.
24. Sharma K, Ziyadeh FN. Hyperglycemia and diabetic kidney disease. The case for transforming growth factor-beta as a key mediator. *Diabetes* 1995; 44: 1139-46.
25. Border WA, Noble NA. Evidence that TGF-beta should be a therapeutic target in diabetic nephropathy. *Kidney Int* 1998; 54: 1390-1.
26. Wolf G, Ziyadeh FN. Molecular mechanisms of diabetic renal hypertrophy. *Kidney Int* 1999; 56: 393-405.
27. Trachtman H.Vitamin E prevents glucose-induced lipid peroxidation and increased collagen production in cultured rat mesangial cells. *Microvasc Res* 1994; 47: 232-9.
28. Studer RK, Craven PA, DeRubertis FR. Antioxidant inhibition of protein kinase C-signaled increases in transforming growth factor-beta in mesangial cells. *Metabolism* 1997; 46: 918-25.
29. Craven PA, DeRubertis FR, Kagan VE, Melhem M, Studer RK. Effects of supplementation with vitamin C or E on albuminuria, glomerular TGF-beta, and glomerular size in diabetes. *J Am Soc Nephrol* 1997; 8: 1405-14.
30. Caballero B. Vitamin E improves the action of insulin. *Nutr Rev* 1993; 51: 339-40.
31. Skrha J, Sindelka G, Hilgertova J. The effect of fasting and vitamin E on insulin action in obese type 2 diabetes mellitus. *Ann N Y Acad Sci* 1997; 827: 556-60.
32. Kedziora-Kornatowska K, Szram S, Kornatowski T, Szadujkis-Szadurski L, Kedziora J, Bartosz G. Effect of vitamin E and vitamin C supplementation on antioxidative state and renal glomerular basement membrane thickness in diabetic kidney. *Nephron Exp Nephrol* 2003; 95: e134-43.
33. Paolisso G, Balbi V, Volpe C, Varricchio G, Gambardella A, Saccomanno F, Ammendola S, Varricchio M, D'Onofrio F. Metabolic benefits deriving from chronic vitamin C supplementation in aged non-insulin dependent diabetics. *J Am Coll Nutr* 1995; 14: 387-92.
34. Jain SK, Palmer M.The effect of oxygen radicals metabolites and vitamin E on glycosylation of proteins. *Free Radic Biol Med* 1997; 22: 593-6.
35. Molyneux CA, Glyn MC, Ward BJ. Oxidative stress and cardiac microvascular structure in ischemia and reperfusion: the protective effect of antioxidant vitamins. *Microvasc Res* 2002; 64: 265-77.
36. Shohat J, Boner G. Role of lipids in the progression of renal disease in chronic renal failure: evidence from animal studies and pathogenesis. *Isr J Med Sci* 1993; 29: 228-39.
37. Nivelstein PF, Sixma JJ, Ottenhof-Rovers M, Wynne HJ, De Groot PG, Banga JD. Platelet adhesion and aggregate formation in type I diabetes under flow conditions. *Diabetes* 1991; 40: 1410-7.

***Original Article***

## **The effect of vitamin E on diabetes induced antioxidant capacity, lipid peroxidation and nephropathy in rats**

Shirpour AR, Tagizadeh Afshari A, Farslihid A, Alameh A, Rasmi F,  
Mogandizadeh H, Saadatiyan R, Dadkhah Tehrani A.

Urmieh University of Medical Sciences, Urmieh, I.R.Iran

**Introduction:** In present study the effect of vitamin E on diabetes induced nephropathy, plasma antioxidant capacity and lipid peroxidation was investigated. **Materials and Methods:** 24 male wistar rats with average body weight of  $250 \pm 20$  gr were chosen. 16 rats, diabetized by STZ (60 mg/kg B.W, i.p) were divided into 3 groups (n=8) of non-diabetic, diabetic non-treated and diabetic treated with Vit.E (300 mg daily). After 8 weeks all rats were anaesthetized by hydrate chloral. After blood sampling, kidneys were removed and kept in 10% formalin buffer. Plasma and red blood cells of blood samples were separated. Plasma antioxidant capacity by FRAP method, and malondialdehyde (MDA) as lipid peroxidation indicator were measured. Also renal samples were studied for focal cell proliferation and glomerule and tubule structural changes. **Results:** MDA in non-diabetic, diabetic and diabetic treated with Vit.E rats was  $126.14 \pm 6.6$ ,  $245.2 \pm 17$  and  $170.8 \pm 9$  nmol/grHb respectively. Significant attenuation of MDA in diabetic treated with Vit. E rats showed decrease of lipid peroxidation in comparison to the diabetic non treated group ( $P<0.01$ ). Antioxidant capacity in the three groups mentioned was  $582.7 \pm 23.33$ ,  $586.2 \pm 23.79$  and  $808.7 \pm 30.82$  mmol/lit respectively. Plasma antioxidant capacity in Vit.E treated rats showed significant augmentation comparing to the first two groups ( $P<0.05$ ). In the non-treated rats, glomerule diffused proliferation, cell diffused inflammation and hyaline changes were seen; arteries walls also shows thickening. These changes were significantly reduction in rats treated with Vit. E. **Conclusion:** This study showed that Vit. E causes decrease the oxidative effects stress and improve diabetes induced nephropathy.

**Key words:** Diabetes, Nephropathy, Oxidative Stress, Vit.E