

بررسی اثر عصاره‌ی هیدروالکلی گیاه بادرنجبویه (*Melissa officinalis L.*) بر میزان شاخص عملکرد کلیوی و آنزیم‌های کبدی در رت‌های دیابتی شده

مهناز رضایی کلیشادی^۱، ستاره زمانی دوآبی^۲، علی قاسمی^۱، آذر رحیمی^۱، ناصر تبی عبدالیوسفی^۱، دکتر سعید چنگیزی آشتیانی^۲، دکتر مجید رمضانی^۲، دکتر علی زارعی^۳

(۱) گروه بیوشیمی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان، اصفهان، ایران (۲) گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران، (۳) مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (۴) باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران، نشانی مکاتبه نویسنده مسئول: باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران دکتر علی زارعی؛ e-mail: zarei.ali40@gmail.com

چکیده

مقدمه: بیماری دیابت با طیف وسیعی از اختلالات کلیوی و کبدی همراه است. هدف این مطالعه، مقایسه تاثیر عصاره‌ی الکلی بخش‌های هوایی بادرنجبویه بر شاخص‌های عملکرد کبدی و کلیوی در رت‌های دیابتی شده بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه، ۳۵ سر رت نژاد ویستار به ۵ گروه بدین شرح تقسیم شدند: شاهد، شاهد دیابتی که روزانه نرمال سالین دریافت می‌کردند و گروه‌های دیابتی که به ترتیب با عصاره‌ی الکلی بادرنجبویه در مقداری ۱۰۰، ۲۰۰ و یا گلی‌بن کلامید ۱۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم تحت درمان قرار گرفتند. دیابتی شدن با تزریق درون صفاقی استرپتوزوسین انجام شد. در پایان دوره‌ی ۲۱ روزه، خون‌گیری انجام شد و پس از اندازه‌گیری میزان آنزیم‌های کبدی و کراتینین و اوره در نمونه‌ها، تحلیل داده‌ها صورت گرفت. یافته‌ها: مقداری آنزیم‌های آلانین ترانس آمیناز (ALT)، آسپارات آمینو‌ترانسفراز (AST) در گروه‌های تحت درمان با عصاره‌ی الکلی گیاه بادرنجبویه تغییر معنی‌داری نسبت به گروه شاهد دیابتی نداشت. در حالی که سطوح سرمی آکالالین فسفاتاز (ALP) و گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT) کاهش معنی‌داری پیدا کرد ($P < 0.05$ ، که در گروه دریافت‌کننده دوز حداقل عصاره گیاه چشم‌گیرتر بود. میزان کراتینین و اوره سرم در گروه دریافت‌کننده دوز حداکثری، کاهش معنی‌داری نسبت به سایر گروه‌ها نشان داد ($P < 0.05$). نتیجه‌گیری: مصرف عصاره‌ی هیدروالکلی بادرنجبویه با کاهش سطوح آنزیم‌های کبدی به ویژه ALP و GGT و هم‌چنین کاهش سطوح فاکتورهای کلیوی اوره و کراتینین در دوزهای موثر مصرفی در بهبود عملکرد کبد و کلیه موثر است.

واژگان کلیدی: بادرنجبویه، آنزیم‌های کبدی، دیابت، رت

دریافت مقاله: ۹۴/۸/۶ – دریافت اصلاحیه: ۹۴/۷/۴ – پذیرش مقاله: ۹۴/۵/۶

کرده است که تا سال ۲۰۲۵ این تعداد به بیش از ۳۰۰ میلیون نفر برسد.^۱ دیابت بیماری مزمونی است که یکی از ویژگی‌های اصلی آن هیپرگلیسمی است. هیپرگلیسمی در دراز مدت بر عملکرد اعضای مختلف بدن از جمله کبد و کلیه تاثیر می‌گذارد.^۲ کبد با تنظیم قند خون از طریق گلیکوژن و

مقدمه

در حال حاضر، دیابت قندی یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مزمون در جهان است که بیش از ۱۷۷ میلیون نفر در دنیا به آن مبتلا هستند. سازمان جهانی بهداشت برآورد

فنولیک متعدد دیگری نظیر کوئرستین، گالیک اسید، روتین، فلاونوئید، آلدئید و تانن است.^{۱۱}

نتایج حاصل از مطالعه موزل و همکارانش در خصوص بررسی اثرات ضد التهابی و حفاظتی عصاره آبی بادرنجبویه در حیوانات آسیب دیده کبدی و کلیوی ناشی از دریافت استامینوفن، نشان‌دهنده نبود اثر حفاظتی کبدی و در عوض وجود توانایی حفاظت کلیوی در برابر آسیب دارویی بود.^۵

همچنین نتایج حاصل از مطالعه سیف و همکاران در خصوص ارزیابی اثرات مغایر ترکیبات آنتی‌اسیدانتی این گیاه بر سمیت کبدی و کلیوی ناشی از ارگانوفسفره مالاتینون نشان داد که مصرف عصاره به میزان ۲۰۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن از بروز اثرات مخرب ناشی از دریافت سم بر روی پارامترهای بیوشیمیایی و بافتی کبدی و کلیوی جلوگیری می‌کند.^{۱۵}

در مطالعات قبلی، اثر این گیاه بر روی بیماری آلزایمن، ضدافسردگی، حافظه و یادگیری مورد بررسی قرار گرفته است، ولی مطالعه‌ای در رابطه با اثر عصاره گیاه بادرنجبویه بر فاکتورهای کبدی- کلیوی در رتهای دیابتی تاکنون صورت نگرفته است. لذا هدف از این مطالعه، بررسی اثر عصاره گیاه بادرنجبویه بر سطح آنزیمهای شاخص عملکرد کبدی (ALT، AST، GGT و ALP) و نیز میزان غلظت آلبومین و فاکتورهای عملکرد کلیوی (اوره و کراتینین) در رتهای دیابتی شده بود.

مواد و روش‌ها

روش تهیه عصاره از بخش‌های هوایی گیاه بادرنجبویه

بخش‌های هوایی گیاه (شکل ۱) بعد از جمع‌آوری از مزارع شهرستان اقلید (فارس/ ایران)، توسط بخش گیاه شناسی دانشگاه پیام نور آباده و به کمک متخصص گیاه‌شناسی و با استناد به کتاب فلور ایران با کد هرباریومی ۱۱۴/۰۱۳/۰۰۱ مورد شناسایی قرار گرفت. جهت تهیه عصاره الکلی گیاه، پس از تهیه بخش‌های هوایی گیاه و جداکردن ناخالصی‌های آن، مقدار ۶۰۰ گرم از گیاه به وسیله آسیاب خرد شد و با نسبت ۱ به ۵ با الکل اتیلیک ۹۰ درصد مخلوط گردید. پس از مدت ۲۴ ساعت روی دستگاه تکان‌دهنده قرار داده شد. سپس عصاره حاصل توسط کاغذ صافی و قیف صاف شده بر روی تفاله باقیمانده الکل اتیلیک ۷۰ درصد ریخته شد و دوباره به مدت ۲۴ ساعت بر روی دستگاه

گلیکوژنولیز نقش مهمی در متابولیسم کربوهیدرات‌ها ایفا می‌کند و با مختل شدن عملکرد کبد هموستاز متابولیکی گلوكز آسیب می‌بیند.^{۱۲} اگرچه مکانیزم دقیق بیماری دیابت قندی تاکنون به خوبی شناخته نشده است، اما افزایش ساخت رادیکال‌های آزاد و مواد التهاب زا از مکانیزم‌های عمدۀ آسیبرسان آن می‌باشد.^۳ مطالعات نشان می‌دهند که مصرف مواد حاوی آنتی‌اسیدانت و ضد التهاب می‌توانند در کاهش عوارض کبدی و کلیوی ناشی از مصرف داروهای ضد دیابتی موثر باشند.^۴ در سال‌های اخیر علاقه به استفاده از گیاهان دارویی در سراسر دنیا و همچنین کشور ایران روندی رو به رشد داشته است.^۵ عوارض جانبی ناشی از مصرف داروهای ضد دیابتی بر روی بافت‌ها و اعضای مختلف، به همراه تداخلات دارویی و نیز کاهش اثربخشی داروها در طول مدت مصرف، از جمله مواردی هستند که تنایل به استفاده از گیاهان دارویی در درمان دیابت و کاهش عوارض و تبعات ناشی از مصرف را دو چندان کرده‌اند.^۶

گیاه بادرنجبویه با نام علمی *Melissa Officinalis* یا Lemon balmone^۷ گیاه دارویی محلی شرق مدیترانه و غرب آسیا است. بادرنجبویه گیاهی معطر، از خانواده نعناعیان و جزو گیاهان پرطوفدار در شرق و غرب جهان است. تاریخ کشت این گیاه به دو هزار سال پیش می‌رسد و به دلیل کثیر مصرف دمنوش آن در فرانسه به چای فرانسه نیز شهرت یافته است. از دیگر گیاهان متعلق به این خانواده می‌توان به مرزه، نعنا، پونه، مرزنچوش، رزماری، کاکوتی، آویشن و اسطوخدوس اشاره کرد.^۷

گیاه بادرنجبویه در طب سنتی به عنوان تقویت‌کننده، آنتی‌اسپاسمودیک، ضد نفخ، افزایش دهنده تعزیریق، مسکن و خواب‌آور استفاده می‌شود.^۸ همچنین این گیاه موجب تقویت حافظه و رهایی از استرس، درمان تبخال، گلودرد و سردرد، تندخویی و حالت عصبی، تب، سوء هاضمه، بی‌خوابی و صرع می‌شود.^{۹-۱۱} مطالعات آزمایشگاهی نیز خاصیت آنتی‌اسیدانتی گیاه بادرنجبویه را اثبات کرده‌اند.^{۱۱} عصاره بادرنجبویه حاوی ترکیبات فنولیک، نظیر کوئرستین و رزمارینک اسید است که خصوصیات ضدالتهابی و آنتی‌اسیدانتی قوی دارند.^۵ ترکیبات پلی‌فنلی از مهم‌ترین آنتی‌اسیدانت‌ها می‌باشند.^{۱۱-۱۲} این ترکیبات به خصوص فلاونوئیدها دارای اثر حفاظتی بر روی کبد در برابر آسیب‌های ناشی از سموم کبدی و رادیکال‌های آزاد هستند.^{۱۳-۱۴} عصاره گیاه بادرنجبویه همچنین حاوی ترکیبات

دارو به صورت داخل صفاقی (i.p.) و تک دوز (۶۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم) تجویز شد و پس از ۴۸ ساعت جهت اطمینان از دیابتی شدن، غلظت گلوكز خون ناشتا با دستگاه EasyGluco Combo (۱۴۲، آمریکا) اندازه‌گیری شد.^{۱۰} مبنای دیابتی شدن، میزان قند خون بالاتر از ۲۲۰ میلی‌گرم در هر دسی‌لیتر در نظر گرفته شد. رت‌های دیابتی عالیم پرنوشی و پرادراری را نشان دادند. حیوانات پس از دیابتی شدن، روزانه دوزهای مذکور عصاره و داروی گلی‌بن‌کلامید را به روش گاواژ و طی مدت سه هفته دریافت نمودند.^{۱۱،۱۲}

تمامی گروه‌ها شب قبل از خون‌گیری در شرایط گرسنگی نگه‌داری شدند، اما دسترسی آزاد به آب داشتند. در طول دوره‌ی آزمایش، سطوح میزان قندخون در روز اول و قبل از دیابتی کردن (به عنوان روز صفر) و سپس به صورت هفتگی اندازه‌گیری و ثبت گردیدند.^{۱۳} دوره‌ی آزمایش ۲۱ روز بود و در این دوره هر روز راس ساعت ۹ صبح تزریقات به صورت گاواژ انجام می‌گرفت. بعد از پایان این دوره، به وسیله بیهوشی خفیف با اتر به منظور ارزیابی میزان قند خون ناشتا، آلانین آمینو ترانسفراز (ALT)، آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST)، آکالان فسفاتاز (ALP)، گاماگلوتامیل ترانسفراز (GGT)، آلبومین، اوره و کراتینین خون‌گیری از قلب به عمل آمد و پس از سانتریفیوژ خون (MiniSpin اپنورف، آلمان) به میزان ۳۰۰۰ دور در دقیقه، سرم‌ها جدا و جهت اندازه‌گیری فاکتورهای مورد نظر به آزمایشگاه انتقال داده شدند.

ارزیابی فاکتورهای بیوشیمیایی

میزان آنزیم‌های کبدی و نیز مقادیر اوره و کراتینین توسط روش رادیو ایمونوآسی (RIA) با کیت (پارس RIA آزمون/ ایران) و با استفاده از دستگاه اتوآنالیزور (1000، آمریکا) اندازه‌گیری شدند. برای اندازه‌گیری آلبومین از روش کالریمتری، و کیت (پیشتاب طب/ ایران) با حساسیت حداقل میزان آلبومین ۲/۰ گرم در دسی‌لیتر استفاده شد. قبل از انجام آنالیز نمونه‌ها، حساسیت و میزان کارایی کیفی دستگاه با دادن نمونه‌های استاندارد و اطمینان از کالیبراسیون آن انجام شد.

تحلیل آماری

میانگین‌های به دست آمده از اندازه‌گیری میزان فاکتورهای مذکور در گروه‌های مختلف از طریق آزمون آماری آنواری یک طرفه یا پست هاک و توکی تست مورد

تکان‌دهنده قرار داده شد و دوباره عصاره به دست آمده صاف و به عصاره اول اضافه شد. بعد از آن، عصاره در دستگاه تقطیر شد تا زمانی که حجم باقی‌مانده به چرخش ۷۰ درصد تقطیر شد و در دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد و دور باقی‌مانده حجم اولیه رسید. در این حالت، مخزن عصاره از دستگاه جدا و عصاره‌ی باقی‌مانده پس از سرد شدن سه مرتبه و در هر بار با حجم ۵۰ میلی‌لیتر کلروفرم دکانته شد. باقی‌مانده در ظرف پتی ریخته شد و در دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد در دستگاه آون (Finetech، کره) خشک شد. حدود ۱۰ گرم به ازای هر ۱۰۰ گرم گیاه خرد شده عصاره به دست آمد. در پایان به وسیله‌ی نرمال سالین، غلظت‌های متفاوت مورد نیاز عصاره بر حسب میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن حیوان تهیه شدند.^{۱۴}

حیوانات

حیوانات از مرکز پرورش حیوانات دانشگاه علوم پزشکی اراک تهیه و در آزمایشگاه حیوانات دانشگاه پیام نور آباده مورد مطالعه قرار گرفتند. حیوانات در دمای ۲۲ تا ۲۶ درجه سانتی‌گراد و به مدت ۱۲ ساعت تاریکی و ۱۲ ساعت روشنایی استقرار پیدا کردند و به صورت تصادفی به ۵ گروه ۷ تایی تقسیم شدند.^{۱۵} در تمامی مراحل کار، کدهای اخلاق کار با حیوانات آزمایشگاهی مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رعایت شدند.

گروه‌بندی

در این مطالعه تجربی، ۲۵ سر رت صحرایی نر نژاد ویستار به ۵ گروه زیر تقسیم شدند:

- (۱) گروه شاهد که تنها تحت رژیم غذایی نرمال و آب بودند، (۲) گروه شاهد دیابتی که روزانه یک میلی‌لیتر نرمال (Streptozocin) و عصاره دریافت کردند، (۳) گروه دیابتی تحت درمان با عصاره‌ی الکلی با درنجبویه به میزان ۱۰۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم، (۴) گروه دیابتی تحت درمان با عصاره‌ی الکلی با درنجبویه به میزان ۲۰۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم و (۵) گروه دیابتی تحت درمان با گلی‌بن کلامید به میزان ۱۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم.^{۱۶}

روش دیابتی کردن حیوانات

دوازده ساعت قبل از تزریق، حیوانات مورد آزمایش با دسترسی آزاد به آب در گرسنگی قرار گرفتند. برای دیابتی کردن حیوانات، از داروی STZ (شرکت Upjohn آمریکا) به صورت محلول در نرمال سالین استفاده شد. این

یافته‌ها

میزان کراتینین سرم در گروه شاهد دیابتی در مقایسه با گروه شاهد افزایش معنی‌داری را نشان داد. در گروه دریافت‌کننده گلی بنکلامید در مقایسه با گروه شاهد دیابتی کاهش معنی‌داری ملاحظه شد. میزان کراتینین در هر دو گروه دریافت‌کننده دوز حداقل و حداًکثری عصاره‌ی گیاه در مقایسه با گروه دریافت‌کننده گلی بنکلامید افزایش معنی‌داری را نشان داد ($P<0.05$). تغییرات کراتینین در گروه‌های دریافت‌کننده عصاره نسبت به گروه شاهد دیابتی تغییرات معنی‌داری را نشان نداد (جدول ۱).

میزان اوره در گروه شاهد دیابتی نسبت به گروه شاهد افزایش معنی‌داری را نشان داد ($P<0.05$). میزان آن در تمام گروه‌های تجربی، کاهش معنی‌داری را در مقایسه با گروه شاهد دیابتی نشان داد، ولی این کاهش در گروه دریافت‌کننده دوز حداًکثر عصاره‌ی گیاه بادرنجبویه چشمگیرتر بود ($P<0.05$) (جدول ۱).

تحلیل آماری قرار گرفتند. کلیه تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه ۱۷ و با در نظر گرفتن $P<0.05$ انجام شد.



شکل ۱- بخش‌های هوایی گیاه بادرنجبویه (*Melissa officinalis L.*)

جدول ۱- بررسی اثرات گیاه بادرنجبویه (*Melissa officinalis L.*) بر میزان آلبومین و شاخص‌های عملکرد کلیوی در رت‌های دیابتی شده توسط استرپتوزوسین

گروه‌ها	پارامترها	گروه‌ها			
		گروه ۱	گروه ۲	گروه ۳	گروه ۴
آلبومین					
(میلی‌گرم در صد میلی‌لیتر)					
کراتینین					
(میلی‌گرم در صد میلی‌لیتر)					
اوره					
(میلی‌گرم در صد میلی‌لیتر)					
۳/۲۲±۰/۱۸	۳/۴۰±۰/۱۵	۳/۸۹±۰/۰۲	۳/۷۲±۰/۰۲	۳/۴۱±۰/۱۱	
٪۰/۴۰۲±۰/۰۵	٪۰/۵۰۲±۰/۰۱	٪۰/۵۸۵±۰/۰۰۶	٪۰/۵۷۵±۰/۰۲	٪۰/۴۷۲±۰/۰۲	
٪۸۴/۲۲±۵/۳۹	٪۶۳/۱۲±۱۲/۲۱	٪۹۶/۲۲±۱۸/۳۱	٪۱۴۵/۱۲±۲۹/۴	٪۲۰/۵۷±۲/۵۲	


* مقایسه با گروه شاهد، ‡ مقایسه با گروه شاهد دیابتی، § مقایسه با گلی بنکلامید، ¶ مقایسه گروه حداقل و حداًکثر عصاره با هم

AST در مقایسه با گروه شاهد دیابتی ایجاد نکرد. در حالی که این میزان در گروه دریافت‌کننده گلی بنکلامید در مقایسه با گروه شاهد دیابتی به صورت معنی‌داری کاهش نشان داد ($P<0.05$).


میزان ALT فقط در گروه دریافت‌کننده دوز ۱۰۰ میلی‌گرم عصاره در مقایسه با گروه گلی بنکلامید کاهش معنی‌داری را نشان داد ($P<0.05$) و در سایر گروه‌ها تغییرات معنی‌داری با یکدیگر و نیز با گروه شاهد دیابتی دیده نشد (نمودار ۱).

میزان آلبومین سرم در گروه شاهد دیابتی در مقایسه با گروه شاهد تغییرات معنی‌داری را نشان نداد. میزان تغییرات آلبومین سرم در تمام گروه‌های تجربی در مقایسه با گروه شاهد دیابتی و در مقایسه با یکدیگر نیز معنی‌دار نبود (جدول ۱).


نمودار ۱ نشان می‌دهد که میزان AST در گروه شاهد دیابتی نسبت به گروه شاهد افزایش معنی‌داری را نشان می‌دهد. دریافت عصاره در گروه‌های دریافت‌کننده دوزهای ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی‌گرم هیچ‌گونه تغییر معنی‌داری در مقادیر



نمودار ۱- مقایسه میانگین سطح سرمه آسپارتات آمینوتранسفراز (AST) و آلانین آمینوتранسفراز (ALT) در رت‌های دیابتی شده با استرپتوزوسین تحت درمان با دوزهای مختلف عصاره‌ی هیدروالکلی بادرنجبویه و گلی‌بن‌کلامید*. مقایسه با گروه شاهد، † مقایسه با گروه شاهد دیابتی، * مقایسه با گروه شاهد دیابتی، ‡ مقایسه با گلی‌بن‌کلامید



نمودار ۲- مقایسه میانگین سطح سرمه آکالان فسفاتاز (ALP) در رت‌های دیابتی شده با استرپتوزوسین تحت درمان با دوزهای مختلف عصاره‌ی هیدروالکلی بادرنجبویه و گلی‌بن‌کلامید*. مقایسه با گروه شاهد، † مقایسه با گروه شاهد دیابتی، ‡ مقایسه با گلی‌بن‌کلامید، ¶ مقایسه گروه حداقل و حداکثر عصاره با هم



نمودار ۳- مقایسه میانگین سطح سرمه گاما‌گلوتامیل ترانسفراز (GGT) در رت‌های دیابتی شده با استرپتوزوسین تحت درمان با عصاره‌ی هیدروالکلی بادرنجبویه و گلی‌بن‌کلامید*. مقایسه با گروه شاهد، † مقایسه با گروه شاهد دیابتی، ‡ مقایسه با گلی‌بن‌کلامید

در عصاره و با مکانیسم حذف رادیکال‌های آزاد اعمال می‌کند. اثرات آنتی‌اکسیدانتی رزمارینک اسید و بنزو‌دیوکسول موجود در عصاره‌ی بادرنجبویه حتی تا ده برابر قوی‌تر از اثرات آنتی‌اکسیدانتی ویتامین‌های B و C است.^{۳۲}

کبد یکی از انداختهایی است که دچار عوارض ناشی از بیماری دیابت می‌شود.^{۳۳} آنزیم‌های ALT و AST به مقدار فراوان در کبد وجود دارند. با آسیب سلول‌های کبدی، آزادسازی این آنزیم‌ها به داخل جریان خون زیاد می‌شود. افزایش در فعالیت آنزیم‌های فوق منعکس‌کننده‌ی آسیب کبدی است. بافت کبد در حیوانات دیابتی نکروزه شده و احتمالاً سبب افزایش فعالیت آنزیم‌های ALT و AST در نتیجه نشت آن‌ها از سیتوزول کبدی به داخل جریان خون می‌شود.^{۳۴}

مطالعه‌ی مشابهی که تاثیر مصرف عصاره‌ی هیدرولکلی گیاه مریم گلی (*Salvia hydrangea*) از خانواده نعنائیان و هم‌گروه بادرنجبویه را بر عملکرد کبد و کلیه در رت‌های دیابتی شده بررسی کرد، نشان داد که این عصاره به مقدار قابل توجهی از اثرات سوء ناشی از بیماری دیابت بر عملکرد کبدی با کاهش معنی‌دار میزان آنزیم AST و نیز شاخص‌های اوره و کراتینین کلیوی، می‌کاهد و این اثرات علاوه بر اثرات آنتی‌دیابتی گیاه به خصوصیات آنتی‌اکسیدانتی گیاه و توانایی آن در مهار استرس اکسیدانتیو نسبت داده شد.^{۳۵}

بررسی نتایج حاصل از مطالعه‌ی خسروی و همکارانش در خصوص بررسی تاثیر دوزهای مختلف مریم کوهی در رت‌های مواجه شده با ایزوپیازید، به عنوان عامل القای استرس اکسیدانتیو، بر آنزیم‌های کبدی ALT, AST, GGT و ALP بافت کبدی نشان دادند که مصرف عصاره اثربخشی معنی‌داری در کاهش سطح آنزیم‌های مذکور و نیز آسیب‌های بافتی حاصل از استرس اکسیدانتیو دارد.^{۳۶}

دیابت به عنوان یک بیماری آندوکرینی با اختلال در متابولیسم کربوهیدرات‌ها^{۳۷} سبب بروز تغییراتی نظیر افزایش ساخت رادیکال‌های آزاد و آلدئید اکسیداز می‌گردد.^{۳۸} تشید استرس اکسیدانتیو، و پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از افزایش تشکیل رادیکال‌های آزاد اکسیژن نقش مهمی در آسیب بافت کلیه در افراد دیابتی دارد. زودرس‌ترین علامت بیماری کلیوی ناشی از دیابت، افزایش ترشح آلبومین در ادرار است.^{۳۹}

داده‌های نمودار ۲ نشان می‌دهند که میزان غلظت ALP در گروه شاهد دیابتی در مقایسه با گروه شاهد افزایش معنی‌داری دارد ($P < 0.05$) و میزان غلظت ALP در گروه‌های دریافت‌کننده گلی‌بن‌گلامید و دوز ۱۰۰ میلی‌گرم عصاره به ترتیب افزایش و کاهش معنی‌داری را با گروه شاهد دیابتی نشان دادند ($P < 0.05$). میانگین میزان ALP بین گروه‌های دریافت‌کننده دوز حداقل و حداکثری اختلاف معنی‌داری نداشت (نمودار ۲).

داده‌های نمودار ۳ نشان می‌دهند که غلظت GGT در گروه شاهد دیابتی در مقایسه با گروه شاهد افزایش معنی‌داری وجود دارد ($P < 0.05$) و هم‌چنین میزان GGT در گروه‌های دریافت‌کننده گلی‌بن‌گلامید و دوز ۱۰۰ میلی‌گرم عصاره در مقایسه با گروه شاهد دیابتی به ترتیب افزایش و کاهش معنی‌داری داشت ($P < 0.05$).

بحث

نتایج مطالعه حاضر نشان دادند که میزان ALP و GGT در گروه دریافت‌کننده دوز حداقل عصاره‌ی گیاه بادرنجبویه کاهش چشمگیری داشت، در حالی که در گروه دریافت‌کننده گلی‌بن‌گلامید، افزایش سطح ALP و GGT در مقایسه با گروه شاهد دیابتی مشاهده شد که این افزایش می‌تواند نشان‌دهنده اثرات سوء کبدی ناشی از مصرف گلی‌بن‌گلامید باشد. هم‌چنین میزان اوره‌ی سرم به طور معنی‌داری در هر سه گروه تحت تیمار کاهش نشان داد و این کاهش در گروه دریافت‌کننده دوز حداکثری چشمگیرتر بود. در مقایسه‌ی تغییرات گروه شاهد دیابتی شده در سطح آنزیم‌های کبدی در تیمار با عصاره‌ی گیاه بادرنجبویه می‌توان گفت تیمار در دوز حداقل این گیاه، در کل سبب کاهش آنزیم‌های کبدی (ALT, ALP, GGT) در مقایسه با گروه شاهد دیابتی شده است. در مورد AST، افزایش بسیار کمی نسبت به گروه شاهد دیابتی دیده شد که قابل توجه نیست، ولی از آنجایی که تغییرات آنزیم‌های کبدی باید به صورت هماهنگ با یکدیگر صورت گیرد، به نظر می‌رسد در تیمار با دوز ۱۰۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم از عصاره‌ی گیاه بادرنجبویه تغییرات مطلوبی در آنزیم‌های کبدی در مقایسه با گروه شاهد دیابتی دیده شد.

عصاره‌ی هیدرولکلی بادرنجبویه دارای اثرات آنتی‌اکسیدانتی قوی و بالقوه، مشابه ویتامین C است و این اثرات را از طریق رزمارینیک اسید و بنزو‌دیوکسول موجود

در پژوهشی دیگر نشان داده شد که عصاره‌ی این گیاه توانایی بالایی برای پاکسازی رادیکال‌های آرینوبیس اتیل بنزتیازوین سولفوریک اسید (ABTS⁺) دارد، ولی در برابر رادیکال سوپراکسید در بدن فعالیت چندانی ندارد.^{۷۷} ثابت شده است که فعالیت آنتی‌اکسیدانتی این گیاه کاملاً واپسی به دوز می‌باشد،^{۷۸} که این موضوع در مطالعه حاضر نیز مشهود است.

در اثر خشک کردن، میزان اسید آسکوربیک و کاروتونوئید این گیاه کاهش می‌یابد، در حالی که درصد محتوای فنولیک آن افزایش می‌یابد. در واقع در گیاه خشک، اسیدهای فنولی به ویژه رزمارینیک اسید و فلاونوئیدها مسئول فعالیت آنتی‌اکسیدانتی هستند.^{۷۹}

اخيراً در مطالعه‌ای نشان داده شد که استفاده از تزریق گیاه lemon balm در کارگران منجر به افزایش قابل توجهی در سطح پلاسمایی مولکول‌های تیول کل (TTM) و ظرفیت آنتی‌اکسیدانت کل (TAC) و کاهش قابل توجهی در تری‌گلیسرید، کلسترول و ترانس آسپارتات (AST) شد، ولی پراکسیداسیون لیپید (LPO) قبل و پس از درمان تفاوتی نشان نداد.^{۸۰} نتایج حاصل از سطح پلاسمایی آنزیم‌های کبدی در مطالعه‌ی حاضر با مطالعات اخیر مطابقت دارد.

ووجدیلو^۱ در سال ۲۰۰۷ نشان داد که در گیاهان تیره‌ی نعناعیان ارتباط مثبتی بین محتوای فنولی و میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانتی وجود دارد.^{۸۱} با توجه به این که خاصیت آنتی‌اکسیدانتی گیاه بادرنجبویه به واسطه وجود فلاونوئیدها و کوئرستین به اثبات رسیده است، انتظار می‌رفت در این مطالعه نیز گیاه بادرنجبویه سطح آنزیم‌های کبدی را کاهش دهد. این کاهش همچنین در مورد فاکتورهای کلیوی شامل آلبومین، کراتینین و اوره نیز دیده شد که در مورد کاهش میزان اوره در دوز حداقل گیاه حتی موثرتر از داروی گلی بنکلامید عمل کرد.

ترکیبات پلی‌فنلی، به ویژه فلاونوئیدها، بر روی سیستم سیتوکروم اثر مهاری دارند، در نتیجه تولید رادیکال‌های آزاد را کاهش می‌دهند؛ همچنین سلول‌ها را در برابر تخلیه‌ی گلوتاتیون احیا با افزایش ظرفیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی (گلوتاتیون، گلوتاتیون ردوکتان، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز) محافظت می‌نمایند.^{۸۲} این ترکیبات چون دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانتی هستند می‌توانند رادیکال‌های آزاد

هنگامی که میزان رادیکال‌های آزاد از حد معینی بیشتر شوند، می‌توانند با آسیب به RNA، DNA، پروتئین‌ها و لیپیدها، مسبب بیماری‌های مختلف از جمله سرطان و بیماری‌های قلبی - عروقی شوند.^{۷۲}

فلاونوئیدها به عنوان آنتی‌اکسیدانت می‌توانند از بیماری‌های تحلیل برند؛ مثل آترواسکلروز، جلوگیری کنند. مکانیسم فعالیت آنتی‌اکسیدانی فلاونوئیدها به علت خاصیت احیا کنندگی آن‌هاست و به همین دلیل می‌توانند با توقیف اکسیژن‌های فعال، تجزیه پراکسیدها، جاروب کردن رادیکال‌ها، خنثی کردن رادیکال‌ها و مهار کردن آنزیم‌های تولیدکننده‌ی گونه‌های فعال اکسیژنی، نقش آنتی‌اکسیدانتی از خود نشان دهند. بعضی از گونه‌های اکسیژن فعال غیررادیکالی مثل هایپوکلروس اسید توسط فلاونوئیدها به دام می‌افتد و حذف می‌شوند. به علاوه، فلاونوئیدها با مهار آنزیم‌های دیگری غیر از اکسیدازها مانند لیپوکسیژن‌ناز می‌توانند از تولید لکوتین‌ها جلوگیری کرده و از سلول‌ها و بافت‌ها محافظت کنند.^{۷۳}

ترکیبات آنتی‌اکسیدانتی اصلی و عمده‌ی گیاه بادرنجبویه، ترکیبات فنولیک هستند،^{۷۴} که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به رزمارینیک اسید، لوئولین-۷-۵-گلوكوزید، کوئرستین-۳-روتینوزوئید، گالیک اسید، کلروژنیک اسید، کوئرستین-۳-گالاكتوزید، فرولیک اسید و مقادیر بسیار کمی وانیلین، ترانس سینامیک اسید، ترانس-۴-کوماریک اسید و هیدروکسی سینامیک اسید اشاره کرد که از این میان رزمارینیک اسید بیش از ۴۰ درصد محتوای فنولیک را به خود اختصاص می‌دهد و پس از آن به ترتیب لوئولین، کوئرستین، گالیک اسید و فرولیک اسید بیشترین مقدار را دارند.^{۷۵}

خصوصیات آنتی‌اکسیدانتی ترکیبات فنلی، وابسته به توانایی آن‌ها در دادن الکترون برای به دام انداختن رادیکال‌های آزاد به وسیله تشکیل ترکیبات پایدار فنوکسیل می‌باشد. خواص آنتی‌اکسیدانی فلاونوئیدها به خاطر وجود گروه‌های هیدروکسیل فنلی در ساختمان آن‌ها است. به دام انداختن و حذف رادیکال‌های آزاد از نقش‌های مهم فعالیت آنتی‌اکسیدانتی این ترکیبات می‌باشد. قابلیت استفاده از داروها با پایه فلاونوئیدی به منظور پیشگیری و یا درمان برخی از بیماری‌هایی است که رادیکال‌های آزاد در ایجاد آن‌ها نقش دارند.^{۷۶}

بیماری‌های کبدی موثر است. این گیاه همچنین بر فاکتورهای کلیه به ویژه اوره موثر است و باعث کاهش اوره خون در بیماران دیابتی می‌شود. به نظر می‌رسد که از یک طرف نبود و یا کمی عوارض ناشی از مصرف عصاره‌ی آبی این گیاه، حتی در مقایسه با نوشیدنی رایجی نظیر چای، و از طرفی داشتن اثرات مفید و متعدد آنتی‌اکسیدانتی و حافظتی سلولی و بافتی آن در برابر آسیب ناشی از استرس اکسیداتیو، این گیاه را نامزد مناسبی به عنوان یک دم نوش رایج و مفید در بعد زندگی روزمره و نیز موضوع پژوهش‌های تحقیقاتی بعدی معرفی می‌کند.

سپاسگزاری: بدین‌وسیله نویسندهان مقاله بر خود فرض می‌دانند که از زحمات و تلاش‌های مسئول محترم آزمایشگاه آریا آزمای اصفهان و نیز بخش گیاه‌شناسی دانشگاه پیام نور آباده تقدیر و تشکر نمایند.

موجود در محیط را خنثی کند. از آنجایی که گیاه بادرنجبویه دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانتی است، بنا بر این کاهش آنزیم‌های کبدی در این آزمایش منطقی به نظر می‌رسد.

رادیکال‌های آزاد باعث تخریب غشاهای سلولی، از جمله سلول‌های هپاتوسیتی شده و با تخریب غشاهای هپاتوسیت‌ها آنزیم‌هایی که در حالت طبیعی درون سیتوزول سلول قرار دارند وارد جریان خون می‌شوند و افزایش فعالیت این آنزیم‌ها بیانگر میزان و نوع آسیب کبدی است.^{۳۳} با توجه به خصوصیات این گیاه که باعث کاهش تولید رادیکال‌های آزاد می‌شود، کاهش آنزیم‌های کبدی در گروه‌های دریافت‌کننده‌ی عصاره قابل انتظار است.

با توجه به نتایج مطالعات قبلی و پژوهش حاضر و همچنین پژوهش‌های همزمان با آن نتیجه‌گیری می‌شود که عصاره‌ی گیاه بادرنجبویه از طریق کاهش ALP.AST و GGT در دوز موثره در بهبود عملکرد کبد و درمان

References

- Holstein A, Hinze S, Thiessen E, Plaschke A, Egberts EH. Clinical implications of hepatogenous diabetes in liver cirrhosis. *J Gastroenterol Hepatol* 2002; 17: 677-81.
- Tappy L, Minehira K. New data and new concepts on the role of the liver in glucose homeostasis. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care* 2001; 4: 273-7.
- Riahy S, Mohammadi M, Sobhani V. Role of oxygen and nitrogen free radicals in diabetes-induced atherosclerosis and effects of exercise on it. *Physiol Pharmacol* 2014; 18: 1-15.
- Son DJ, Hwang SY, Kim MH, Park UK, Kim BS. Anti-Diabetic and Hepato-Renal Protective Effects of Ziyuglycoside II Methyl Ester in Type 2 Diabetic Mice. *Nutrients* 2015; 7: 5469-83.
- Muzell DP, Lunardelli A, Leite CE, Fagundes RM, Saciura VC. Nephroprotective and anti-inflammatory effects of aqueous extract of *Melissa officinalis* L. on acetaminophen-induced and pleurisy-induced lesions in rats. *Braz Arch Biol Technol* 2013; 56: 383-92.
- Bathaie S, Mokarizade N, Shirali S. An Overview of the Mechanisms of Plant Ingredients in the Treatment of Diabetes Mellitus. *JMP* 2012; 4: 1-24.
- Sajadi E, Naderi G, Ziaeef R. Antioxidant effects of some medicinal plants 2004; 8: 1-17.
- Akhondzach S, Noroozian M, Mohammadi M, Ohadinia S, Jamshidi AH, Khani M. *Melissa Officinalis* extract in the treatment of patients with mild to moderate Alzheimer's disease a double blind, randomized, placebo controlled trial. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2003; 74: 863-6.
- Arceusz A, Wesolowski M, Ulewicz-Magulska B. Flavonoids and Phenolic Acids in Methanolic Extracts, Infusions and Tinctures from Commercial Samples of Lemon Balm. *Nat Prod Commun* 2015; 10: 977-81.
- de Carvalho NC, Corrêa-Angeloni MJ, Leffa DD, Moreira J, Nicolau V, et al. Evaluation of the genotoxic and antigenotoxic potential of *Melissa officinalis* in mice. *Genet Mol Biol* 2011; 34: 290-7.
- Pereira RP, Fachinetto R, De Souza Prestes A, Puntel RL, Santos da Silva GN, Heinzmam BM, et al. Anti oxidant effects of different extracts from *Melissa officinalis*, *Matricaria recutita* and *Cymbopogon citratus*. *Neurochem Res* 2009; 34: 973-83.
- Pyo Y, Lee T-C, Logendra L, Rosen R.T. Antioxidant activity and phenolic compounds of Swiss chard (*Beta vulgaris* subspecies *cycla*) extracts. *Food Chemistry* 2004; 85: 19-26.
- Ahmad A, Pillai KK, Najmi AK, Ahmad SJ, Pal SN, Balani DK. Evaluation of hepatoprotective potential of jigrine post-treatment against thioacetamide induced hepatic damage. *J Ethnopharmacol* 2002; 79: 35-41.
- Yoshikawa M, Xu F, Morikawa T, Ninomiya K, Matsuda H. Antistatins A and B, new skeletal flavonoids with hepatoprotective activities from the desert plant *Anastatica hierochuntica*. *Bioorg Med Chem Lett* 2003; 13: 1045-9.
- Sief MM, Khalil FA, Abou-Arab AAK, Abou Donia MA, El-Sherbiny AM, Mohamed SR, et al. Ameliorative Role of *Melissa Officinalis* against Hepatorenal Toxicities of Organophosphorus Malathion in Male Rats. *MOJ Toxicol* 2015; 1: 2-8.
- Zarei A, Changizi-Ashtiani S, Rezaei A, Abdolyousefi N, Ghasemi A. The Experimental Study of the Effect of Hydroalcoholic Extracts of *Chelidonium majus* on Liver Function Tests and Renal in Rats with Hypercholesterolemia. *JMP* 2013; 4: 117-25.
- Anand P, Murali KY, Tandon V, Chandra R, Murthy PS. Preliminary studies on antihyperglycemic effect of aqueous extract of *Brassica nigra* (L.) Koch in strept-

- ozotocin induced diabetic rats. Indian J Exp Biol 2007; 45: 696-701.
18. Zarei A, Changizi-Ashtiyani S, Taheri S, Rasekh F. Comparison between effects of different doses of *Melissa officinalis* and atorvastatin on the activity of liver enzymes in hypercholesterolemia rats. AJP 2014; 4: 15-23.
19. Thiruvenkatasubramaniam R, Jayakar B. Anti-Hyperglycemic and Anti-Hyperlipidaemic Activities of *Bauhinia variegata* L on Streptozotocin Induced Diabetic Rats. Der Pharmacia Lettre 2010; 2: 330-4.
20. Zare T, Mokhtari M, Mohammadi J. The Effect of Hydroalcoholic Extracts of *Prangos Ferulacea* on Blood Factors of Kidney and Liver Functions in Diabetic Male Wistar Rats. JFUMS 2012; 2: 174-80.
21. Changizi-Ashtiyani S, Yarmohammady P, Hosseini N, Salehi I, Ramazani M. The Effect of *Althaea officinalis* L Root Alcoholic Extract on Blood Sugar Level and Lipid Profiles of Streptozotocin Induced-Diabetic Rats. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 2015; 17: 238-50.
22. Nan JX, Park EJ, Kang HC, Park PH, Kim JY, Sohn DH. Anti-fibrotic effects of a hot-water extract from *Salvia miltiorrhiza* roots on liver fibrosis induced by biliary obstruction in rats. J Pharm Pharmacol 2001; 53: 197-204.
23. Behnam Rassouli M, Ghayour N, Afsharian M, Tehranipour M, Ghayour M. The protective effects of *Melissa officinalis* leaves usage on learning disorder induced by lead acetate administration during pre and postnatal periods in rats. Arak University of Medical Sciences Journal 2010; 13: 97-104.
24. Birkenfeld AL, Shulman GI. Nonalcoholic fatty liver disease, hepatic insulin resistance, and type 2 diabetes. Hepatology 2014; 59: 713-23.
25. Mulhall BP, Ong JP, Younossi ZM. Non-alcoholic fatty liver disease: an overview. J Gastroenterol Hepatol 2002; 17: 1136-43.
26. Seppala-Lindroos A, Vehkavaara S, Hakkinen AM, Goto T, Westerbacka J, Sovijärvi A, et al. Fat accumulation in the liver is associated with defects in insulin suppression of glucose production and serum free fatty acids independent of obesity in normal men. J Clin Endocrinol Metab 2002; 87: 3023-8.
27. Zarei A, Vaezi GH, Malekirad AA, Abdollahi M. Effects of ethanol extract of *Salvia hydrangea* on hepatic and renal functions of streptozotocin-induced diabetic rats. Avicenna J Phytomed 2015; 5: 138-47.
28. Khosravi M, Khakpour S, Tajadod G, Tokazabani Balasi F. Effect of *Salvia officinalis* hydroalcoholic extract on liver enzymes in male rat. Medical Sciences 2013; 23: 113-9.
29. Rush E, Crook N, Simmons D. Point-of-care testing as a tool for screening for diabetes and pre-diabetes. Diabet Med 2008; 25: 1070-5.
30. Ghafari S, Balajadeh BK, Golalipour MJ. Effect of *Urtica dioica* L. (Urticaceae) on testicular tissue in STZ-induced diabetic rats. Pak J Biol Sci 2011; 14: 798-804.
31. Chang YC, Chuang LM. The role of oxidative stress in the pathogenesis of type 2 diabetes: from molecular mechanism to clinical implication. Am J Transl Res 2010; 316-31.
32. Lu JM, Lin PH, Yao Q, Chen C. Chemical and molecular mechanisms of antioxidants: experimental approaches and model systems. J Cell Mol Med 2010; 14: 840-60.
33. Kadifkova Panovska T, Kulevanova S, Stefova M. In vitro antioxidant activity of some *Teucrium* species (Lamiaceae). Acta Pharm 2005; 55: 207-14.
34. Katalinic V, Milos M, Kulusic T, Jukic M. Screening of 70 medicinal plant extracts for antioxidant capacity and total phenols. Food Chemistry 2006; 94: 550-7.
35. Kulusic – Bilusic T, Katalini CV, Dragović-Uzelac V, Ljubenkov I, Krisko A, Dejanovic B, et al. Antioxidant and Acetylcholinesterase Inhibiting Activity of Several Aqueous Tea Infusions in vitro. Food technology and biotechnology 2008; 46: 368-75.
36. Mortazaei S, Rafieian M, Ansary Samani R, Shahinfard N. Comparison of Phenolic Compounds Concentrations and Antioxidant Activity of Eight Medicinal Plants. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 2013; 12: 519-30.
37. Mantle D, Eddebe F, Pickering AT. Comparison of relative antioxidant activities of British medicinal plant species in vitro. J Ethnopharmacol 2000; 72: 47-51.
38. Canadanovic-Brunet J, Cetković G, Djilas S, Tumbas V, Bogdanović G, Mandić A, et al. Radical scavenging, antibacterial, and anti proliferative activities of *Melissa officinalis* L. extracts. J Med Food 2008; 11: 133-43.
39. Capecka E, Mareczek A, Leja M. Antioxidant activity of fresh and dry herbs of some Lamiaceae species. Food Chem 2005; 93: 223-6.
40. Fazli D, Malekirad AA, Pilevarian AA, Salehi H, Zerratpishe A, Rahzani K, et al. Effects of *Melissa officinalis* L. on Oxidative Status and Biochemical Parameters in Occupationally Exposed Workers to Aluminum: A Before after Clinical Trial. International Journal of Pharmacology 2012; 8: 455-8.
41. Wojdylo A, Oszmian'ski J, Czemerys R. Antioxidant activity and phenolic compounds in 32 selected herbs. Food Chemistry 2007; 105: 3940-9.
42. A-Qarawi AA, Abdel-Rahman HA, Ali BH, El Mougy SA. Liquorice (*Glycyrrhizaglabra*) and the adrenal-kidney-pituitary axis in rats. Food and Chemical Toxicology 2002; 40: 1525-7.
43. Zarei A, Shariati M, ShekarForosh S, Ashtiyani S, Rasekh F. The effect of *Physalis alkekengi* extract on the physiologic function of organ tissues: A mini-review. Arak University of Medical Sciences Journal 2012; 15: 94-104.

Original Article

The Effects of *Hydroalcoholic Extract of Melissa officinalis .L* on the Level of Renal Function and Liver Enzymes in Diabetic Rats

Rezaei M¹, Zamani S¹, Ghasemi A¹, Rahimi A¹, Nabi N¹, Changizi- Ashtiani S², Ramezani M³, Zarei A⁴

¹Department of Biochemistry, Payame Noor University of Esfahan, ²Department of Physiology, Arak University of Medical Sciences, ³Endocrinology and Metabolism Research Center, Endocrinology and Metabolism Clinical Sciences Institute, Tehran University of Medical Sciences, ⁴Young Researchers and Elite Club, Abadeh Branch, Islamic Azad University, Abadeh, I.R. Iran

e-mail: zarei.ali40@gmail.com

Received: 22/07/2015 Accepted: 28/10/2015

Abstract

Introduction: Diabetes mellitus is associated with a wide range of kidney and liver disorders. The aim of this study was to compare the effect of alcoholic extract of aerial parts of *Melissa officinalis* on indicators of liver function and kidney in diabetic rats. **Materials and Methods:** Thirty-five wistar rats were divided into 5 groups (n=7 each) as follows: Control, diabetic control and three diabetic groups, which received alcoholic extract of *Melissa officinalis* at doses of 100, 200 mg/kg body weight respectively through gastric gavage and glibenclamide 10 mg/ kg, for a period of 3 weeks. Diabetes was induced by streptozotocin (STZ). At the end of this period (21 days), blood samples were collected for measurement of liver enzymes and factors for data analysis. **Results:** Amounts of enzyme levels of alanine transaminase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST) in the group treated with the extract, compared to the diabetic control group showed no significant changes, whereas serum levels of alkaline phosphatase (ALP) and gamma glutamyl transferase (GGT) were significantly reduced ($P<0.05$), which declined most in the group receiving the minimum dose of the extract. Serum creatinine and urea in the group receiving the highest dose showed a significant decrease compared to other groups ($P<0.05$). **Conclusion:** The extract *Melissa officinalis* with lower levels of liver enzymes, particularly ALP and GGT and renal markers, urea and creatinine was effective in improving liver function and treatment of diseases of the liver and kidneys.

Keywords: *Melissa officinalis*, Liver, Diabetes, Glibenclamide, Rats