

بررسی سیستماتیک ارتباط نمایه توده بدنی و میزان هورمون آنتی‌مولرین در زنان سنین باروری

نازنین مصلحی^۱، دکتر سکینه شب بیدار^۲، دکتر فهیمه رمضانی تهرانی^۳، دکتر پروین میرمیران^۴، دکتر فریدون عزیزی^۵

(۱) مرکز تحقیقات تغذیه در بیماری‌های غدد درون‌ریز، پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، (۲) گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و رژیم‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران، (۳) مرکز تحقیقات آندوکرینولوژی تولیدمثل، پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، (۴) گروه آموزشی تغذیه بالینی و رژیم درمانی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، انسستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، (۵) مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم، پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، نشانی مکاتبه‌ی نویسنده مسئول: تهران، ولنجک، پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، مرکز تحقیقات آندوکرینولوژی تولیدمثل، دکتر فهیمه رمضانی تهرانی؛ دکتر پروین میرمیران؛ e-mail: ramezani@endocrine.ac.ir

تهران، ولنجک، پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، مرکز تحقیقات تغذیه در بیماری‌های غدد درون‌ریز، دکتر پروین میرمیران؛ e-mail: mirmiran@endocrine.ac.ir

چکیده

مقدمه: هدف از این مطالعه، مرور سیستماتیک مطالعاتی است که به بررسی ارتباط نمایه توده بدنی (BMI) با هورمون آنتی‌مولرین (AMH)، پرداخته‌اند. مواد و روش‌ها: برای بازیابی مقالات مرتبط در دو پایگاه PubMed و Scopus با استفاده از کلید واژه‌های مناسب، جستجو صورت گرفت. مقالات اصلی که تا دسامبر ۲۰۱۶ چاپ شده بودند و به بررسی ارتباط نمایه توده بدنی یا سطوح آن با میزان هورمون AMH در زنان سنین باروری پرداخته بودند، واحد شرایط ورود به این مطالعه بودند. یافته‌ها: در این مطالعه، ۲۶ مقاله وارد گردید. افراد شرکت‌کننده بر حسب ابتلا به سندروم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS) و ناباروری به سه گروه زنان مبتلا به PCOS، زنان نابارور غیر مبتلا به PCOS و زنان بارور و غیر مبتلا به PCOS تقسیم شدند. ۷ مطالعه از ۱۱ مطالعه در زنان PCOS، ۳ مطالعه از ۷ مطالعه در زنان مبتلا به ناباروری و ۴ مطالعه از ۵ مطالعه در زنان بارور غیر مبتلا به PCOS، همبستگی منفی بین BMI و AMH را گزارش کردند. با این وجود قدرت همبستگی بین این دو متغیر کوچک بود (به طور عمدۀ کمتر از ۰/۳). در ۴ مطالعه از ۶ مطالعه در زنان PCOS، ۱ مطالعه از ۳ مطالعه در زنان نابارور و ۲ مطالعه از ۷ مطالعه در زنان بارور غیر مبتلا به PCOS، میزان AMH در زنان چاق کمتر از زنان غیر چاق بود. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های مطالعات کنونی و تناقض در آنها، ارتباط BMI و میزان ذخیره تخمدانی، نامشخص است.

واژگان کلیدی: چاقی، نمایه توده بدنی، هورمون آنتی‌مولرین، AMH، ذخیره تخمدانی

دریافت مقاله: ۹۶/۱۲/۲۰ - ۹۷/۲/۲۱ - پذیرش مقاله: ۹۷/۳/۱۲

ذخایر تخمدانی دارد که در نهایت می‌تواند بر باروری موثر باشد، به طوری که کاهش بیش از حد ذخیره تخمدانی منجر به تضعیف پاسخ تخمدان و کاهش باروری می‌شود.^{۱,۲} به علاوه میزان ذخیره تخمدانی، یک فاکتور مهم در پیشگویی زمان وقوع یائسگی است^{۳,۴} و این در حالی است که خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی - عروقی، نرولوژی، سرطان‌های مرتبط با هورمون‌های جنسی و حتی مرگ در زنان تحت تاثیر زمان وقوع یائسگی است.^{۵,۶} به طور کلی ذخایر تخمدانی از زمان بلوغ تا یائسگی با افزایش سن، کاهش می‌یابد، با این وجود،

مقدمه

هورمون آنتی‌مولرینⁱ (AMH) که توسط سلول‌های گرانولازای فولیکول تخمدان ترشح می‌شود، شاخص مناسبی برای تعیین تعداد فولیکول‌های تخمدانی یا همان ذخیره تخمدانی است.^۱ ذخیره تخمدانی، پتانسیل عملکرد و سن تخمدان را نشان می‌دهند. هم‌چنین، میزان پاسخ به تحريك تخمدان توسط گنادوتروفیپین‌ها، بستگی به میزان

شده به زبان انگلیسی محدود گردید. فهرست منابع مقالات نیز برای یافتن مقالات مرتبط بیشتر بررسی شد.

معیار راهیابی و عدم راهیابی به مطالعه

مقالات اصلی که تا دسامبر ۲۰۱۶ چاپ شده بودند و به بررسی ارتباط نمایه توده بدنی (کمی) یا سطوح مختلف آن (گروه‌بندی) با میزان هورمون AMH در زنان سنین باروری، سنین ۱۹-۵۰ سال، پرداخته بودند، واجد شرایط ورود به این مطالعه موروری بودند. مطالعات انجام شده بر نمونه‌های غیرانسانی، مقالات موروری، گزارش موردی، نامه به سردبیر، نتایج کنفرانس‌ها، مطالعات انجام شده بر روی کودکان، مردان، زنان باردار و شیرده، زنان یائسه (یائسگی طبیعی و یا جراحی)، بیماران مبتلا به سرطان، HIV، اختلالات غدد درون‌ریز، زنان با میزان ذخایر تخدمانی کاهش یافته^{۱۰} و زنان با سابقه جراحی هیسترکتومی و اووفورکتومی از مطالعه خارج شدند.

غربالگری مقالات و استخراج داده‌ها

به منظور سهولت در غربالگری موارد بازیابی شده، نتایج جستجو به برنامه Endnote منتقل گردید. پس از حذف موارد تکراری، دو نفر به صورت مستقل، عنوان و چکیده هر مورد را بررسی کردند. در صورتی که چکیده مقاله‌ای مرتبط با موضوع به نظر می‌رسید، متن کامل مقاله بازیابی گردید و با استفاده از پرسشنامه‌ایی که معیارهای راهیابی به مطالعه در آن در نظر گرفته شده بود، واجد شرایطی مطالعه بررسی گردید. در صورت عدم توافق بین دو نفر بررسی‌کننده، اجماع بر اساس نظر بررسی‌کننده سوم صورت می‌گرفت. پس از شناسایی مقالات مرتبط، داده‌های هر مطالعه شامل نام نویسنده اول مقاله، سال چاپ مقاله، نام مجله، جمعیت مورد مطالعه، خصوصیات افراد شرکت‌کننده شامل حجم نمونه، سن، مقادیر BMI و AMH، نقطه برش تعریف شده برای طبقه‌بندی BMI (در صورت وجود)، ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن (در صورت وجود) استخراج گردید. این پژوهش در سی و سومین جلسه کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش زیست پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ (کد اخلاق: IR.SBMU.ENDORCINE.REC.1395.323) تصویب شده است.

میزان آن در زنان هم سن و سرعت اتلاف آن در طی زمان در افراد مختلف، متفاوت است.^{۷-۹} با توجه به افزایش سن ازدواج و به تأخیر انداختن زمان فرزندآوری و همچنین ارتباط زمان وقوع سن یائسگی با پیامدهای مختلف مربوط به سلامت زنان، شناسایی عوامل موثر در تعیین میزان ذخایر تخدمانی در زنان سنین باروری تبدیل به یک اولویت پژوهشی شده است.

چاقی مشکلی شایع در زنان سنین باروری است که می‌تواند بر عملکرد تولیدمثی آنان اثرگذار باشد.^{۱۰} عدم تحمل‌گذاری، اختلالات قاعده‌گی، ناباروری و خطر سقط جنین در زنان چاق بیشتر است. همچنین در زنان ناباروری که در جستجوی استفاده از فناوری‌های کمک باروری^۱ هستند، احتمال موقتی درمان در افراد چاق کمتر است. مکانیسم‌های مختلفی برای ارتباط چاقی با عملکرد تولیدمثی در زنان پیشنهاد شده است.^{۱۱} یکی از مکانیسم‌های احتمالی، می‌تواند کمتر بودن میزان ذخایر تخدمانی در زنان چاق در مقایسه با زنان با وزن طبیعی باشد. با این وجود مطالعاتی که میانگین AMH در دو گروه زنان چاق و غیر چاق را مقایسه کرده‌اند، نتایج متفاوتی را نشان داده‌اند.^{۱۱-۱۳} برخی مطالعات همبستگی منفی و معنی‌داری بین AMH و BMI در زنان سنین باروری را نشان می‌دهند^{۱۴-۱۵} در حالی‌که سایر مطالعات نتوانستند چنین ارتباطی را نشان دهند^{۱۶-۱۷} و یا حتی همبستگی مثبت، گزارش نموده‌اند.^{۱۸} با توجه به ناشخص بودن ارتباط BMI با ذخیره تخدمانی، هدف از انجام این مطالعه، مرور سیستماتیک مطالعاتی است که به بررسی ارتباط AMH با BMI در زنان سنین باروری پرداخته‌اند.

مواد و روش‌ها


استراتژی جستجو

برای بازیابی مقالات مرتبط، جستجو در دو پایگاه PubMed و Scopus با استفاده از کلید واژه‌های مناسب، ovarian گرفت. برای جستجو از کلید واژه‌های anti mullerian hormone ovarian aging reserve body mass index Müllerian-inhibiting AMH weight adiposity obesity overweight BMI استفاده شد. نتایج جستجو به مقالات چاپ

عنوان و چکیده، متن کامل ۹۲ مقاله بررسی گردید که ۲۶ مقاله واجد شرایط ورود به مطالعه مروری حاضر بودند (شکل ۱).^{۸,۱۱-۲۰}

یافته‌ها

تعداد ۴۰۵۵ مورد بر اساس جستجوی سیستماتیک انجام شده، بازیابی شد. پس از حذف موارد یافته شده بر اساس



شكل ۱ - فلوچارت انتخاب مطالعات

نمايه توده بدنی و هورمون AMH در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS) در ۶ مطالعه به طور همزمان ارتباط گروههای مختلف BMI و مقدار کمی BMI با میزان هورمون AMH در زنان مبتلا به PCOS بررسی شده است.^{۱۱,۱۲,۲۲,۲۰-۲۲} و در ۵ مطالعه فقط همبستگی AMH و BMI در این گروه زنان، بررسی شده است.^{۲۳,۲۴-۲۶} از میان مطالعاتی که همبستگی BMI و AMH را بررسی کرده‌اند، در ۴ مطالعه میزان همبستگی در کل افراد شرکت‌کننده در مطالعه، شامل زنان مبتلا به PCOS و نابارور غیر مبتلا به PCOS، گزارش گردیده زنان غیرنابارور و غیر مبتلا به PCOS. نمايه توده بدنی و هورمون آنتی مولرین

در بیشتر مطالعات، نقطه برش تعريف چاقی، BMI بیشتر یا بیشتر مساوی ۲۵ در نظر گرفته شده بود به جز در ۵ مطالعه، که در یکی بر اساس BMI بیشتر مساوی ۲۷^{۲۰} و در ۴ مطالعه بر اساس ۳۰ تعريف شده است.^{۱۹,۲۰,۲۱,۲۴} از بین مطالعات با تعريف چاقی بر اساس نقطه برش ۳۰، در یک مطالعه افراد دارای اضافه وزن در گروه زنان با وزن طبیعی (غیر چاق)، قرار داده شده‌اند.^{۲۰} در دو مطالعه نیز افراد بر اساس وضعیت BMI به بیش از دو گروه تقسیم شدند، در خصوصیات مطالعاتی که وارد این مقاله مروری شدند، در جدول ۱ و ۲ آمده است.

جدول ۱- مطالعات بررسی‌کننده همبستگی نمایه توده بدنی و میزان هورمون AMH در زنان سنین باروری

نوسنگان (فرانس)	سال	نوع مطالعه	تعداد	سن، سال	نمایه توده بدنی، kg/m ²	مقادیر مبستگی	مقدار P
مطالعات انجام شده در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی‌کیستیک							
پیگنی ⁱ و همکاران ^{۱۱}	۲۰۰۳	مورد-شاهدی	۵۹	۲۷/۴(۲۱/۳-۳۳/۱) [*]	۲۶/۷(۱۸/۷-۳۷/۷) [*]	-۰/۰۶	-۰/۰۶
چن ⁱⁱ و همکاران ^{۱۴}	۲۰۰۸	مقطعی	۹۹	۳۳(۲۹-۳۰) [†]	۲۳(۱۷/۶-۳۷/۱) [†]	-۰/۲۱۳	-۰/۰۲۵
پیوکا ⁱⁱⁱ و همکاران ^{۱۲}	۲۰۰۹	مورد-شاهدی	۲۰۰	سنین باروری	-	-۰/۰۳۱	-۰/۰۰۵
سهمی ^{iv} و همکاران ^{۲۲}	۲۰۱۱	مقطعی	۲۳۲ (۱۰۷ نفر مبتلا به PCOS و ۲۲۵ نفر نابارور غیر PCOS)	۳۱/۶±۵/۵	۲۵/۸±۳/۱	-۰/۰۰۸	-۰/۹۶
لين ^v و همکاران ^{۲۴}	۲۰۱۱	کوهورت	۲۹۰ خانم نابارور (۱۲۶ نفر مبتلا به PCOS و ۱۶۴ نابارور غیر PCOS)	۲۷/۷±۵/۸	۲۵/۳±۶/۶	-۰/۱۶۶	-۰/۰۰۴
لي ^{vi} و همکاران ^{۱۸}	۲۰۱۲	مورد-شاهدی	۱۳۱ (۶۹ بدون هیپرآندروژنیسم)	۲۹±۴	=۲۰/۱ ±۵/۸ =بدون هیپرآندروژنیسم	-۰/۲۶	<۰/۰۵
کاگلار ^{vii} و همکاران ^{۲۵}	۲۰۱۲	کوهورت	۳۴	۲۶±۲/۷	۲۲/۱±۱/۶	-۰/۱۶	-۰/۲۴
چویی ^{viii} و همکاران ^{۲۶}	۲۰۱۴	کوهورت	۳۰۴	۲۸/۲	۲۲/۷±۳/۲	-۰/۱۴۸	-۰/۰۱

ⁱ -Pignyⁱⁱ -Chenⁱⁱⁱ -Piouka^{iv} -Sahmay^v -Lin^{vi} -Li^{vii} -Caglar^{viii} -Cui

ادامه جدول ۱-

نويسندهان (فرانس)	سال	نوع مطالعه	تعداد	سن، سال	نمایه توده بدنی، kg/m ²	مقدار همبستگی	مقدار P
کريسمان ⁱ و همکاران ^{۲۲}	۲۰۱۵	مقطعی	۱۰۴	۲۵/۲±۵/۲	۲۱±۵/۱	-۰/۲۹	۰/۰۴
کريسمان و همکاران ^{۲۳}	۲۰۱۵	مقطعی	۲۸۵	۲۹/۹±۸/۴	PCOS=۲۱±۵/۱ نابارور ۲۵/۹±۵/۰	-۰/۰۴	>۰/۰۵
يانگ ⁱⁱ و همکاران ^{۲۰}	۲۰۱۵	مقطعی	۱۵۶	۲۴	۲۱/۶(۱۹/۷-۲۳/۴) [†] چاچ ۳۱(۲۹/۳-۲۵/۱)	-۰/۳۹	۰/۰۰۱
السرزانا- گلينيانويكز ⁱⁱⁱ و همکاران ^{۲۱}	۲۰۱۵	مقطعی	۷۶	۲۵/۵±۵/۲	۲۸/۹±۸/۱	-۰/۳۰	<۰/۰۱
مطالعات انجام شده در زنان نابارور							
پيگنى و همکاران ^{۱۱}	۲۰۰۳	مورد-شاهدی	۴۵	۲۸/۳(۲۴-۳۳) [*]	۲۳/۱(۱۹/۲-۳۱/۲) [*]	-۰/۲۸	۰/۰۴۸
ناردو ^{iv} و همکاران ^{۱۶}	۲۰۰۷	مقطعی	۱۲۶	۳۳(۲۹-۳۵) [†]	۲۴(۲۱/۴-۲۷/۵) [†]	-۰/۰۱	۰/۸۸
بيوک ^v و همکاران ^{۱۲}	۲۰۱۱	مقطعی	۱۲۸	۳۷/۱±۴/۸	۲۷/۳±۵/۹	-۰/۱۵	۰/۰۷
چوري و همکاران ^{۲۲}	۲۰۱۴	کوهورت	۱۸۹۶	۳۸/۲	۲۲/۷±۳/۲	-۰/۰۶	۰/۰۰۶
۳۵۰ خانم نابارور از چهار نژاد قفقازی، قفقازی ^۶							
موی ^{vi} و همکاران ^{۲۸}	۲۰۱۵	مقطعی	۳۶±۶	۳۶±۶	۲۵/۹±۶	-۰/۰۲۴	۰/۰۰۲
آسياني ^{vii}					۲۸/۱±۵/۹	= اسياني	= قفقازی
آسياني ^{viii}					۳۸/۱±۴/۸	= اسياني	= آسياني
آسياني ^{ix}					۳۷/۶±۵/۲	= آسياني	= آسياني
آسياني ^x					۳۵/۸±۵/۲	= آسياني	= آسياني

i -Kriseman

ii -Yang

iii -Olszanecka-Glinianowicz

iv -Nardo

v- Buyuk

vi- Moy

ادامه جدول ۱-

نوع مطالعه	سال	تعداد	سن، سال	نمایه توده بدنی، kg/m ²	مقدار همبستگی	مقدار P
کوهورت	۲۰۱۵	۱۹۵	۳۵/۶	۳۶/۷±۳/۷	۰/۰۱	۰/۸۲
مقطعی	۲۰۱۶	۵۲۴۰	۲۱-۶۴	-	-۰/۱۸	<۰/۰۱
مطالعات انجام شده در زنان بارور و غیر مبتلا به سندروم تخمدان پلی‌کیستیک						
مقطعی	۲۰۱۰	۱۳۷	۳۱/۷±۹	۲۲/۵±۲/۴	-۰/۳۴۵	<۰/۰۵
مقطعی	۲۰۱۰	۱۲۰	۳۷/۲±۵/۰	۲۲/۱±۲/۹	-۰/۰۸۷	>۰/۰۵
مقطعی	۲۰۱۱	۲۲۲	۲۹/۴	۲۳/۷±۸/۲	-۰/۱۸	<۰/۰۱
مقطعی	۲۰۱۲	۴۱۶	۳۴(۱۸-۵۱) [†]	-	-۰/۱	۰/۰۳
مقطعی	۲۰۱۴	۱۰۱۵	۳۶/۷	۲۷±۴/۶	-۰/۱۵	<۰/۰۰۱
* میانگین (دامنه)، [†] میانه (دامنه)، [‡] میانه (فاصله میان چارکی).						

i -Bakas

ii -Dafopoulos

iii -Park

iv-Lambert-Messerlian

v -La Marca

vi -Tehrani

جدول ۲- مطالعات مقایسه کننده میانگین AMH در افراد چاق و غیر چاق در زنان سنتین باروری

نویسندهان (فرانس)	سال	نوع مطالعه	افراد شرکت کننده	تعداد گروهها	نقشه برش BMI	نمايه توده بدنی به تفکیک گروهها	میانگین AMH در گروهها ^۰
مطالعات انجام شده در زنان نابارور غیر مبتلا به سندروم تخدمان پلی کیستیک							
پیگنی و همکاران ^{۱۱}	۲۰۰۳	مورد-شاهدی	۵۹	۲	۲۵	-	$۴۴/۵ \pm ۱۶/۶ = \text{زنان چاق، پیکومول بر لیتر} (P=0.22)$
پیوکا و همکاران ^{۱۲}	۲۰۰۹	مورد-شاهدی	۲۰۰	۲	۲۵	-	$۶/۵ \pm ۲/۷ = \text{غیر چاق در مقابل} ۶/۴ \pm ۲/۹ \text{ چاق} (P<0.001)$
سهمی و همکاران ^{۱۳}	۲۰۱۱	مقطعي	۱۰۷	۲	۲۵	-	$۶/۹ \pm ۲/۹ = \text{غیر چاق در مقابل} ۶/۷ \pm ۲/۲ \text{ چاق} (P=0.76)$
یانگ و همکاران ^{۱۰}	۲۰۱۵	مقطعي	۱۵۶	۲	۲۷	$۲۱/۶(۱۹/۷-۲۲/۴)^{\dagger} = \text{غیر چاق}= ۳۷(۱۹-۵۶)^{\dagger}$	$۲۱/۶(۱۹/۷-۲۲/۴)^{\dagger} = \text{غیر چاق}= ۳۷(۱۹-۵۶)^{\dagger}$
السرانکا- گلینیانویکز و همکاران ^{۱۴}	۲۰۱۵	مقطعي	۸۷	۲	۲۵	$۲۱/۳ \pm ۲/۲ = \text{غیر چاق}$	$۸/۹ \pm ۴/۴ = \text{غیر چاق در مقابل} ۷ \pm ۴ = \text{چاق} (P<0.001)$
کریسمن و همکاران ^{۱۵}	۲۰۱۵	مقطعي	۱۰۴	۴	۲۵-۲۹/۹	$۲۹/۹ \pm ۲/۸ = \text{برابر BMI}$	$۲۹/۹ \pm ۲/۸ = \text{برابر BMI}$
مطالعات انجام شده در زنان نابارور							
پیگنی و همکاران ^{۱۱}	۲۰۰۳	مورد-شاهدی	۴۵	۲	۲۵	-	$۱۰/۹ \pm ۱۲/۴ = \text{در زنان PCOS با BMI کمتر از} ۱۰/۹ \pm ۱۲/۴$
پیوک و همکاران ^{۱۳}	۲۰۱۱	مقطعي	۱۲۸	۲	۲۵	-	$۱/۸ \pm ۱/۵ = \text{غیر چاق در مقابل} ۲ \pm ۲/۴ = ۲ \pm ۲/۴ = \text{چاق} (P=0.7)$
سهمی و همکاران ^{۱۶}	۲۰۱۱	مقطعي	۲۲۵	۲	۲۵	-	$۲/۲۸ \pm ۱/۰ = \text{غیر چاق در مقابل} ۲/۲۷ \pm ۱/۰ = \text{چاق} (P=0.95)$

ادامه جدول ۲

نویسنگان	سال	نوع مطالعه	افراد شرکت‌کننده	تعداد گروه‌ها	نقطه برش BMI	نمایه توده بدنی به تفکیک گروه‌ها	میانگین AMH در گروه‌ها
مطالعات انجام شده در زنان بارور و غیر مبتلا به سندرم تحملان پلی‌کیستیک							
پیوکا و همکاران ^{۱۲}	۲۰۰۹	مورد-شاهدی	۵۰	۲	۲۵	=۲۲/۴±۱/۵ =۳/۹±۱/۴ = غیر چاق در مقابله = ۲/۴±۰/۲ = چاق (عدم گزارش مقدار P<0/۰۵)	نمایه توده بدنی به تفکیک گروه‌ها
استینر و همکاران ^{۱۳}	۲۰۱۰	Exploratory	۲۰	۲	۲۵	=۲۱/۹±۱/۶ =۴/۴±۱/۸ = غیر چاق در مقابله = ۲/۹±۲/۱ = چاق (۰/۰۵)	نمایه توده بدنی به تفکیک گروه‌ها
HALAWATY و همکاران ^{۱۰}	۲۰۱۰	مقطعی	۱۰۰	۲	۳۰	=۲۵/۶±۱/۴ =۳۲/۹±۱/۳ = چاق (۰/۰۵)	نمایه توده بدنی به تفکیک گروه‌ها
شو ⁱⁱⁱ و همکاران ^{۱۴}	۲۰۱۱	مقطعی	۱۳۵	۳	۲۵	- =۴/۶(۲/۴-۵/۶) ^{۱۵} = چاق (۰/۰۷۶)	نمایه توده بدنی به تفکیک گروه‌ها
السزانکا - گلینیانویکز و همکاران ^{۱۶}	۲۰۱۰	مقطعی	۶۷	۲	۲۵	=۲۲/۲±۲ =۳۲/۴±۵/۴ = چاق (۰/۰۵)	نمایه توده بدنی به تفکیک گروه‌ها
لامبرت - مسرلین و همکاران ^{۱۷}	۲۰۱۶	کوهورت	۴۵	۲	۲۵	- =۰/۴-۰/۱ = زنان چاق (۰/۰۸۹)	نمایه توده بدنی به تفکیک گروه‌ها
ال-سافی و همکاران ^{۱۸}	۲۰۱۶	مدخله	۲۷	۲	۲۵	=۲۱/۸±۱/۷ =۳/۵±۲/۱ = زنان با وزن طبیعی در مقابله = ۴/۲±۲/۷ = زنان چاق (۰/۰۳۳)	نمایه توده بدنی به تفکیک گروه‌ها

^۱ واحد بر اساس نانوگرم بر میلی‌لیتر، در غیر این صورت واحد ذکر گردیده است. ^۲ میانه (فاصله میان چارکی)، ^۳ میانه (۹۵٪ فاصله اطمینان)، ^۴ میانه (دامنه)

i -Steiner

ii -Halawaty

iii -Shaw

iv -Al-Safi

(P<0.07)^{۱۱} در حالی که در ۲ مطالعه دیگر تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.^{۱۲،۲۲}

نمایه توده بدنی و هورمون AMH در زنان غیر مبتلا به ناباروری و غیرمبتلا به PCOS
از بین مطالعاتی که همبستگی AMH و BMI در زنان سالم را گزارش کرده‌اند، ۴ مطالعه همبستگی معکوس^{۸،۱۰،۲۷،۳۲} و یک مطالعه عدم وجود همبستگی^{۱۷} را نشان دادند. در مطالعه‌ایی که جمعیت آن شامل ۸۷ خانم مبتلا به PCOS و ۶۷ خانم سالم بود نیز همبستگی منفی معنی‌دار بین BMI و AMH گزارش شده است.^{۲۱}

از ۷ مطالعه‌ایی که به مقایسه میزان هورمون AMH در زنان غیر مبتلا به ناباروری و PCOS پرداخته‌اند^{۱۲،۲۱-۱۹،۲۲،۳۴،۳۱}، ۲ مطالعه نشان دادند که میزان این هورمون در زنان چاق کمتر از افراد غیر چاق است^{۱۹،۳۱} در حالی که در ۴ مطالعه، تفاوت معنی‌داری بین گروه‌ها مشاهده نشده است.^{۲۰،۳۲،۳۳،۳۴} در مطالعه موردی - شاهدی پیوکا و همکاران، میانگین AMH در زنان چاق و غیر چاق به ترتیب ۲/۴±۰/۳ و ۲/۹±۱/۴ نانوگرم در میلی‌لیتر، گزارش شده است ولی مقدار عددی P برای مقایسه این دو مقدار بیان نشده است.^{۱۲}

بحث

نتایج حاصل از این مطالعه مروری سیستماتیک نشان می‌دهد که بر اساس یافته‌های مطالعات کنونی و تناقض در این یافته‌ها، نتیجه گیری در مورد ارتباط وضعیت چاقی و BMI با میزان هورمون AMH در زنان سنتین باروری ناممکن است. در بیشتر مطالعات مورد بررسی، تعداد افراد شرکت کننده کم بوده است. در مطالعاتی که بیشترین حجم نمونه را در زنان سالم، نابارور و PCOS داشتند، همبستگی منفی کوچکی بین AMH و BMI، گزارش گردیده است.^{۲۶،۲۷،۳۰}

چاقی بر میزان باروری در هر دو جنس اثر می‌گذارد.^{۱۰،۳۶} افزایش تولید آندروژن‌ها در بافت چربی و افزایش تبدیل آن‌ها به استروژن با افزایش فعالیت آروماتاز بافت چربی و همچنین کاهش سنتز پروتئین متصل شونده به هورمون‌های جنسی (SHBG)، از طریق ایجاد فیدبک مهاری بر محور هیپوتالاموس، هیپوفیز و گنادها، منجر به مهار فولیکوژن در زنان چاق می‌گردد. همچنین پیشنهاد شده است که چاقی می‌تواند بر عملکرد فولیکولی، اثر گذارد.^{۳۷} در زنان

از مجموع ۱۱ مطالعه بررسی‌کننده همبستگی^{۲۴-۲۶،۳۰-۳۲} ۱۱،۰۲،۰۴،۰۸،۲۲ در ۳ مطالعه عدم وجود ارتباط معنی‌دار بین BMI و AMH گزارش شده است.^{۱۱،۰۲،۰۵} در یک مطالعه، همبستگی معنی‌داری بین AMH و BMI در ۴۸۹ خانم نابارور که ۱۰۴ نفر آنان مبتلا به PCOS بودند، مشاهده نشد در حالی که بررسی همبستگی فقط در میان زنان مبتلا به PCOS، نشان داد که با افزایش AMH، BMI کاهش می‌یابد.^{۳۲} نتایج یک مطالعه نیز نشان داد که در زنان PCOS که سطوح آندروژن بالا ندارند، با افزایش AMH، BMI افزایش می‌یابد.^{۱۸}

از میان مطالعاتی که میزان AMH را در گروه‌های مختلف BMI مقایسه کردند، در ۲ مطالعه تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد^{۱۱،۲۲} در حالی که چهار مطالعه دیگر نشان دادند که میزان AMH به طور معنی‌داری در زنان چاق مبتلا به PCOS کمتر از زنان غیر چاق است.^{۱۲،۳۰-۳۲} تنها در یک مطالعه، طبقه‌بندی افراد بر اساس وضعیت BMI بیش از دو گروه بود. در آن مطالعه، زنان با BMI کمتر از ۲۵ به طور معنی‌داری میزان AMH بیشتری در مقایسه با سایر گروه‌ها با BMI بیشتر از ۲۵، داشتند و این تفاوت در مقایسه با گروه زنان با ۳۰ BMI تا ۳۴/۹، بیشتر بود.^{۳۲}

نمایه توده بدنی و هورمون AMH در زنان مبتلا به PCOS ناباروری غیرمبتلا به

از ۷ مطالعه بررسی‌کننده همبستگی AMH و BMI در زنان نابارور^{۱۱،۱۳،۱۶،۲۶،۲۹،۳۵}، ۳ مطالعه همبستگی معنی‌داری مشاهده نکردند^{۱۳،۱۶،۲۹} در حالی که همبستگی منفی معنی‌داری - در مطالعات پیگنی و همکاران در ۴۵ خانم نابارور^{۱۱،۰/۰۶۴-۰/۱۸} به ترتیب در ۱۸۹۶ و ۵۲۴۰ و ۵۲۴۰ خانم نابارور در مطالعات چوبی و همکاران،^{۳۶،۳۰} گزارش شده است. در مطالعه‌ای مشتمل بر ۳۵۰ خانم نابارور از چهار نژاد مختلف قفقازی، اسپانیایی، آفریقایی-آمریکایی و آسیایی، AMH فقط در گروه زنان قفقازی همبستگی معکوس با BMI داشت^{۲۴،۰/۰۰۲=P=۰/۰۰۲}. در ۳ مطالعه‌ایی که میزان همبستگی در کل زنان نابارور که شامل زنان مبتلا به PCOS، نیز بود،^{۲۲،۰۲،۲۴} یک مطالعه همبستگی معکوس گزارش کرده است.^{۲۴}

در ۳ مطالعه، میزان AMH بر حسب وضعیت چاقی در زنان نابارور بررسی گردید^{۱۱،۰۲،۳۲} که فقط در یک مطالعه، میانگین AMH در زنان با BMI بیشتر مساوی ۲۵ به طور حاشیه‌ایی کمتر از زنان با BMI کمتر از ۲۵ بود

همکاران، همبستگی بین BMI و AMH پس از کنترل سن از ۰/۰-۰/۷۶ + تغییر یافت که از نظر آماری معنی‌دار بود ولی این تغییر جهت همبستگی ممکن است به دلیل کوچک بودن میزان همبستگی اولیه و اضافه شدن متغیر دیگر به مدل باشد.^{۷۷} در مطالعه کریسمن و همکاران، ارتباط منفی بین BMI و AMH حتی پس از کنترل سن معنی‌دار باقی ماند و از ۰/۲۹ -۰/۰-۳۱ به تغییر یافت.^{۷۸} از مطالعاتی که میانگین AMH را در زنان چاق به طور معنی‌داری کمتر از غیر چاق گزارش کردند، در سه مطالعه تفاوت معنی‌داری در میانگین سن دیده نمی‌شود.^{۷۹-۸۵} در حالی‌که در یک مطالعه، میانگین سنی در زنان چاق به طور معنی‌داری بیشتر است^{۸۱} و در مطالعه دیگر، مقایسه ای از نظر سن بین گروه‌ها انجام نشده است.^{۸۲} همچنین در یک مطالعه، علی‌رغم این که سن در زنان چاق بیشتر از غیر چاق بود، تفاوت معنی‌داری در میزان هورمون AMH، مشاهده نشده است.^{۸۴}

در مطالعه ای تفاوت در نژاد افراد شرکت‌کننده، به عنوان یکی از دلایل احتمالی عدم یکسانی نتایج در مطالعات مختلف پیشنهاد شده است.^{۸۸} با این وجود، بررسی مطالعاتی که بر روی یک نژاد انجام شده است نیز نتایج متناقض نشان می‌دهند.^{۸۲،۸۳،۸۷} موی^۱ و همکاران نشان دادند که ازین چهار نژاد مختلف قفقازی، اسپانیایی، آفریقایی-آمریکایی و آسیایی، همبستگی معکوس و معنی‌داری بین AMH و BMI، فقط در نژاد قفقازی وجود دارد^{۸۸} در حالی‌که مطالعه شو^۲ و السازنکا-گلینیانویکز^{۳۳} که در زنان قفقازی انجام شده است عدم تفاوت معنی‌داری در میزان AMH بین دو گروه چاق و غیر چاق را گزارش کردند.^{۳۳}

در زنان مبتلا به PCOS، میزان هورمون AMH، بیشتر از زنان غیر مبتلا به PCOS است.^{۱۱} از طرفی دیگر، شیوع چاقی در زنان PCOS بالا است و می‌تواند سبب بدتر شدن عالیم بالینی آنان گردد.^۴ بنابراین ممکن است ارتباط BMI و AMH در زنان مبتلا به PCOS نسبت به زنان غیر مبتلا متفاوت باشد. در مطالعه پیگنی و همکاران، عدم تفاوت معنی‌دار در میزان AMH در زنان چاق و غیر چاق مبتلا به PCOS و عدم مشاهده همبستگی در این زنان بر خلاف مشاهده ارتباط معنی‌دار در زنان نابارور غیر مبتلا به PCOS، از طریق اثر آندروئن‌ها بر هورمون AMH توضیح

چاق، آپوپتوز سلول‌های گرانولولوزای فولیکول که منشا ترشح AMH است، پیشنهاد شده است که می‌تواند منجر به کاهش ترشح AMH به ازای هر فولیکول در زنان چاق شود.^{۷۲} اثرات آپیتوز چاقی بر سلول‌های گرانولولوزا ممکن است بتواند منجر به آترزی فولیکولی و کاهش ذخیره تخمدانی گردد. با این وجود، مطالعاتی که ارتباط چاقی با AMH را گزارش کرده‌اند، تفاوت اندکی در میانگین AMH در زنان چاق را نسبت به زنان غیر چاق نشان می‌دهند. در مطالعاتی که همبستگی منفی بین AMH و BMI مشاهده شده است نیز، شدت این همبستگی اندک است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که این تفاوت اندک در میزان AMH در زنان چاق، نشان‌دهنده کمتر بودن ذخایر تخمدانی در آنان باشد. اگر میزان ذخیره تخمدانی در زنان چاق کمتر از زنان غیر چاق باشد، باید انتظار داشت که وقوع یائسگی طبیعی در زنان چاق، زودتر از غیر چاق روی دهد. این در حالی است که تنها در یک مطالعه با افزایش BMI، یائسگی زودتر روی داده است.^{۸۸} سایر مطالعات ارتباطی ندیده‌اند و یا وقوع دیرتر یائسگی در زنان چاق را مشاهده کرده‌اند.^{۳۹} در مجموع، به نظر می‌رسد که ارتباط BMI با AMH ناشی از تغییرات فیزیولوژیکی و یا تغییر در عملکرد فولیکول‌های تخمدان در زنان چاق باشد نه کمتر بودن میزان ذخیره تخمدانی. به BMI احتمال زیاد، این تغییرات فیزیولوژیک در زنان چاق با بیشتر از ۳۰ در مقایسه با زنان با وزن طبیعی (BMI کمتر از ۲۵) مشهودتر است. مطالعاتی که نتوانستند چنین تفاوتی را نشان دهنده، ممکن است به دلیل وجود زنان دارای اضافه وزن با BMI ۲۵ تا ۳۰ باشد چرا که طبقه‌بندی این افراد در هر دو گروه چاق و یا غیر چاق می‌تواند سبب رقیق شدن تفاوت بین دو گروه شود.

با توجه به ارتباط سن با دو متغیر BMI و AMH، این فرضیه ایجاد شده است که ارتباط BMI و AMH به طور ثانویه و ناشی از متغیر سوم یعنی سن است. برخی مطالعات با ورود همزمان متغیرهای BMI و سن در رگرسون خطی و در نظر گرفتن AMH به عنوان متغیر وابسته نشان دادند که سن متغیر مستقل پیشگویی می‌زان AMH است.^{۸۰،۷} مطالعات اندکی اثر سن را در بررسی همبستگی و AMH کنترل کرده‌اند.^{۷۷،۷۲،۷۲} در مطالعه پارک، همبستگی AMH - غیر معنی‌دار پس از کنترل سن، برای AMH و BMI گزارش شده است اگرچه میزان همبستگی خام قبل از کنترل سن گزارش نشده است.^{۷۷} در مطالعه تهرانی و

دارد. اگر چه BMI معمولاً برای ارزیابی وضعیت چاقی استفاده می‌شود، ممکن است به درستی نشان‌دهنده توده چربی بدن نباشد. بنابراین برای روشن شده ارتباط چاقی با میزان هورمون AMH و ذخیره تخدمانی، باید ارزیابی توده چربی با روش‌های دقیق‌تر صورت گیرد و همچنین نحوه توزیع چربی در مطالعات آینده، مورد توجه قرار گیرد.

در پایان، با توجه به یافته‌های مطالعات کنونی، ارتباط BMI و میزان ذخیره تخدمانی، نامشخص است. برخی مطالعات تفاوت اندکی در میزان هورمون AMH در زنان چاق و غیر چاق و یا همبستگی منفی بسیار کوچکی را بین BMI و AMH را نشان داده‌اند. مقایسه AMH به تفکیک در گروه‌های مختلف BMI شامل زنان با وزن طبیعی، دارای اضافه وزن، چاقی با درجه‌های مختلف، با در نظر گرفتن حجم نمونه کافی در هر گروه در مطالعات آینده باید مورد توجه قرار گیرد. برای روشن شدن ارتباط BMI و AMH در مطالعات آینده، باید اثر سن به درستی کنترل شود. همچنین، طراحی و انجام مطالعات طولی که میزان کاهش BMI فولیکول‌های تخدمانی را در زنان بر اساس وضعیت بررسی نماید، برای روشن شدن اثر چاقی بر فرآیند پیری تخدمان و میزان ذخیره تخدمانی، ضروری به نظر می‌رسد.

سپاسگزاری: پژوهش حاضر بخشی از پایان‌نامه دکترای خانم ناظرین مصلحی است که با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده است (شماره گرفت ۱۳۹۶/۴۰۴۶-۷).

تعارض منافع: نویسندهای اعلام می‌دارند که هیچ‌گونه تضاد منافعی در پژوهش حاضر وجود ندارد.

i-Li

داده شده است و این طور بحث شده است که اثرات مثبت قوی بین آنдрودئن‌ها و AMH در زنان مبتلا به PCOS، اثرات ضعیف BMI بر این هورمون را از بین برده است.¹¹ اگر ارتباط مثبت بین آنдрودئن‌ها و هورمون AMH سبب از بین رفتن اثر BMI شود در مطالعه لی¹ و همکاران انتظار می‌رفت که همبستگی مثبت بین BMI و AMH در زنان PCOS که مبتلا به هیپرآندرودئنیسم بودند مشاهده شود نه در زنان بدون هیپرآندرودئنیسم.¹¹ سایر مطالعات موربدی-شاهدی که شامل هر دو گروه زنان مبتلا و غیر مبتلا به PCOS است، وجود یا عدم ارتباط BMI با AMH را در هردو گروه مشاهده نموده‌اند.^{12,22,26} روشن شدن این مساله که ابتلا به PCOS بر ارتباط چاقی و BMI با هورمون AMH اثر دارد، مستلزم انجام مطالعات بیشتری است.

در این مطالعه برای اولین بار کلیه مطالعاتی که به بررسی ارتباط چاقی و BMI با میزان AMH در زنان سنتین باروری پرداخته‌اند به صورت سیستماتیک بررسی شده است. با این وجود باید به برخی از محدودیت‌های این مطالعه اشاره نمود. محدود کردن نتایج جستجو به مطالعات چاپ شده و همچنین مطالعات منتشر شده به زبان انگلیسی، از محدودیت‌های اصلی هستند. بیشتر مطالعاتی که بررسی شده‌اند، حجم نمونه ناکافی داشتند و ارتباط‌ها حتی در مطالعات کوهرت، به صورت مقطعی بررسی شده است و بنابراین تغییرات میزان AMH در طی زمان بر حسب وضعیت چاقی، مشخص نیست. طبقه‌بندی مطالعات به سه گروه مطالعات انجام شده در زنان PCOS، نابارور غیر مبتلا به PCOS و زنان بارور غیر مبتلا به PCOS از نقاط قوت این مطالعه است، اما احتمال اشتباه در طبقه‌بندی وجود

References

1. Jamil Z, Fatima SS, Ahmed K, Malik R. Anti-Mullerian Hormone: Above and Beyond Conventional Ovarian Reserve Markers. Dis Markers 2016; 2016: 5246217.
2. Amanvermez R, Tosun M. An Update on Ovarian Aging and Ovarian Reserve Tests. Int J Fertil Steril 2016; 9: 411-5.
3. Depmann M, Faddy MJ, van der Schouw YT, Peeters PH, Broer SL, Kelsey TW, et al. The Relationship Between Variation in Size of the Primordial Follicle Pool and Age at Natural Menopause. J Clin Endocrinol Metab 2015; 100: E845-51.
4. Gohari MR, Ramezani Tehrani F, Chenouri S, Solaymani-Dodaran M, Azizi F. Individualized predictions of time to menopause using multiple measurements of antimüllerian hormone. Menopause 2016; 23: 839-45.
5. Tehrani FR, Erfani H, Cheraghi L, Tohidi M, Azizi F. Lipid profiles and ovarian reserve status: a longitudinal study. Hum Reprod 2014; 29: 2522-9.

6. Daan NM, Fauser BC. Menopause prediction and potential implications. *Maturitas* 2015; 82: 257-65.
7. Freeman EW, Sammel MD, Lin H, Boorman DW, Gracia CR. Contribution of the rate of change of antimüllerian hormone in estimating time to menopause for late reproductive-age women. *Fertil Steril* 2012; 98: 1254-9 e1-2.
8. La Marca A, Sighinolfi G, Papaleo E, Cagnacci A, Volpe A, Faddy MJ. Prediction of age at menopause from assessment of ovarian reserve may be improved by using body mass index and smoking status. *PLoS One* 2013; 8: e57005.
9. de Kat AC, van der Schouw YT, Eijkemans MJ, Herbert-Gast GC, Visser JA, Verschuren WM, et al. Back to the basics of ovarian aging: a population-based study on longitudinal anti-Müllerian hormone decline. *BMC Med* 2016; 14: 151.
10. Jungheim ES, Travieso JL, Hopeman MM. Weighing the impact of obesity on female reproductive function and fertility. *Nutr Rev* 2013; 71 Suppl 1: S3-8.
11. Pigny P, Merlen E, Robert Y, Cortet-Rudelli C, Decanter C, Jonard S, et al. Elevated Serum Level of Anti-Müllerian Hormone in Patients with Polycystic Ovary Syndrome: Relationship to the Ovarian Follicle Excess and to the Follicular Arrest. *J Clin Endocrinol Metab* 2003; 88: 5957-62.
12. Piouka A, Farmakiotis D, Katsikis I, Macut D, Gerou S, Panidis D. Anti-Müllerian hormone levels reflect severity of PCOS but are negatively influenced by obesity: relationship with increased luteinizing hormone levels. *Am J Physiol Endocrinol Metab* 2009; 296: E238-43.
13. Buyuk E, Seifer DB, Illions E, Grazi RV, Lieman H. Elevated body mass index is associated with lower serum anti-müllerian hormone levels in infertile women with diminished ovarian reserve but not with normal ovarian reserve. *Fertil Steril* 2011; 95: 2364-8.
14. Chen MJ, Yang WS, Chen CL, Wu MY, Yang YS, Ho HN. The relationship between anti-Müllerian hormone, androgen and insulin resistance on the number of antral follicles in women with polycystic ovary syndrome. *Hum Reprod* 2008; 23: 952-7.
15. Dafopoulos A, Dafopoulos K, Georgoulas P, Galazios G, Limberis V, Tsikouras P, et al. Smoking and AMH levels in women with normal reproductive history. *Arch Gynecol Obstet* 2010; 282: 215-9.
16. Nardo LG, Christodoulou D, Gould D, Roberts SA, Fitzgerald CT, Laing I. Anti-Müllerian hormone levels and antral follicle count in women enrolled in in vitro fertilization cycles: relationship to lifestyle factors, chronological age and reproductive history. *Gynecol Endocrinol* 2007; 23: 486-93.
17. Park HT, Cho GJ, Ahn KH, Shin JH, Kim YT, Hur JY, et al. Association of insulin resistance with anti-Müllerian hormone levels in women without polycystic ovary syndrome (PCOS). *Clin Endocrinol (Oxf)* 2010; 72: 26-31.
18. Li Y, Ma Y, Chen X, Wang W, Li Y, Zhang Q. Different diagnostic power of anti-Müllerian hormone in evaluating women with polycystic ovaries with and without hyperandrogenism. *J Assist Reprod Genet* 2012; 29: 1147-51.
19. Steiner AZ, Stanczyk FZ, Patel S, Edelman A. Anti-müllerian hormone and obesity: insights in oral contraceptive users. *Contraception* 2010; 81: 245-8.
20. Halawaty S, ElKattan E, Azab H, ElGhamry N, Al-Inany H. Effect of obesity on parameters of ovarian reserve in premenopausal women. *J Obstet Gynaecol Can* 2010; 32: 687-90.
21. Lambert-Messerlian G1, Roberts MB, Urlacher SS, Ah-Ching J, Viali S, et al. First assessment of menstrual cycle function and reproductive endocrine status in Samoan women. *Hum Reprod* 2011; 26: 2518-24.
22. Sahmay S, Guralp O, Senturk LM, Imamoglu M, Kucuk M, Irez T. Serum anti-müllerian hormone concentrations in reproductive age women with and without polycystic ovary syndrome: The influence of body mass index. *Reprod Med Biol* 2011; 10: 113-20.
23. Shaw CM, Stanczyk FZ, Egleston BL, Kahle LL, Spittle CS, Godwin AK, et al. Serum antimüllerian hormone in healthy premenopausal women. *Fertil Steril* 2011; 95: 2718-21.
24. Lin YH, Chiu WC, Wu CH, Tzeng CR, Hsu CS, Hsu MI. Antimüllerian hormone and polycystic ovary syndrome. *Fertil Steril* 2011; 96: 230-5.
25. Caglar GS, Kahyaoglu I, Pabuccu R, Demirtas S, Seker R. Anti-Müllerian hormone and insulin resistance in classic phenotype lean PCOS. *Arch Gynecol Obstet* 2013; 288: 905-10.
26. Cui Y, Shi Y, Cui L, Han T, Gao X, Chen ZJ. Age-specific serum antimüllerian hormone levels in women with and without polycystic ovary syndrome. *Fertil Steril* 2014; 102: 230-236.e2.
27. Tehrani FR, Mansournia MA, Solaymani-Dodaran M, Azizi F. Age-specific serum anti-Müllerian hormone levels: estimates from a large population-based sample. *Climacteric* 2014; 17: 591-7.
28. Moy V, Jindal S, Lieman H, Buyuk E. Obesity adversely affects serum anti-müllerian hormone (AMH) levels in Caucasian women. *J Assist Reprod Genet* 2015; 32: 1305-11.
29. Bakas P, Boutas I, Creatsa M, Vlahos N, Gregoriou O, Creatsas G, et al. Can anti-Müllerian hormone (AMH) predict the outcome of intrauterine insemination with controlled ovarian stimulation? *Gynecol Endocrinol* 2015; 31: 765-8.
30. Yang JH, Chou CH, Yang WS, Ho HN, Yang YS, Chen MJ. Iron stores and obesity are negatively associated with ovarian volume and anti-Müllerian hormone levels in women with polycystic ovary syndrome. *Taiwan J Obstet Gynecol* 2015; 54: 686-92.
31. Olszanecka-Glinianowicz M, Madej P, Owczarek A, Chudek J, Skalba P. Circulating anti-Müllerian hormone levels in relation to nutritional status and selected adipokines levels in polycystic ovary syndrome. *Clin Endocrinol (Oxf)* 2015; 83: 98-104.
32. Kriseman M, Mills C, Kovanci E, Sangi-Haghpeykar H, Gibbons W. Antimüllerian hormone levels are inversely associated with body mass index (BMI) in women with polycystic ovary syndrome. *J Assist Reprod Genet* 2015; 32: 1313-6.
33. Lambert-Messerlian G, Plante B, Eklund EE, Raker C, Moore RG. Levels of antimüllerian hormone in serum during the normal menstrual cycle. *Fertil Steril* 2016; 105: 208-13.e1.
34. Al-Safi ZA, Liu H, Carlson NE, Chosich J, Harris M, Bradford AP, et al. Omega-3 Fatty Acid Supplementation Lowers Serum FSH in Normal Weight But Not Obese Women. *J Clin Endocrinol Metab* 2016; 101: 324-33.
35. Cui L, Qin Y, Gao X, Lu J, Geng L, Ding L, et al. Antimüllerian hormone: correlation with age and androgenic and metabolic factors in women from birth to postmenopause. *Fertil Steril* 2016; 105: 481-5.
36. Sermondade N, Faure C, Fezeu L, Shayeb AG, Bonde JP, Jensen TK, et al. BMI in relation to sperm count: an

- updated systematic review and collaborative meta-analysis. *Hum Reprod Update* 2013; 19: 221-31.
37. Barber TM, McCarthy MI, Wass JA, Franks S. Obesity and polycystic ovary syndrome. *Clin Endocrinol (Oxf)* 2006; 65: 137- 45.
38. Dratva J, Gómez Real F, Schindler C, Ackermann-Liebrich U, Gerbase MW, Probst-Hensch NM, et al. Is age at menopause increasing across Europe? Results on age at menopause and determinants from two population-based studies. *Menopause* 2009; 16: 385-94.
39. Tao X, Jiang A, Yin L, Li Y, Tao F, Hu H. Body mass index and age at natural menopause: a meta-analysis. *Menopause* 2015; 22: 469-74.
40. Rondanelli M, Perna S, Faliva M, Monteferrario F, Repaci E, Allieri F. Focus on metabolic and nutritional correlates of polycystic ovary syndrome and update on nutritional management of these critical phenomena. *Arch Gynecol Obstet* 2014; 290: 1079-92.

Review Article

Systematic Review of the Association between BMI and Anti-mullerian Hormone (AMH) Levels in Reproductive Aged Women

Moslehi N¹, Shab-Bidar S², Ramezani Tehrani F³, Mirmiran P^{1,4}, Azizi F⁵

¹Nutrition and Endocrine Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran, ²Department of Community Nutrition, School of Nutritional Sciences and Dietetics, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, ³Reproductive Endocrinology Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran,

⁴Department of Clinical Nutrition and Dietetics, Faculty of Nutrition Sciences and Food Technology, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran,

⁵Endocrine Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, I.R. Iran

e-mail: ramezani@endocrine.ac.ir, mirmiran@endocrine.ac.ir

Received: 11/03/2018 Accepted: 03/06/2018

Abstract

Introduction: The aim of the current study was to systematically review studies on the associations of obesity or body mass index (BMI) with anti-mullerian hormone (AMH). **Materials and Methods:** PubMed and Scopus databases were searched using the appropriate keywords.

Original studies published up to December 2016, that evaluated the independent associations of BMI or obesity with AMH in reproductive aged women, were considered eligible. **Results:** In this study, 26 articles were included. Based on Polycystic ovarian syndrome (PCOS) and fertility status, participants were divided into three groups of PCOS women, infertile non-PCOS women, and fertile and non-PCOS women. Seven of 11 studies on PCOS, 3 of 7 studies on infertile and 4 of 5 studies on non- PCOS women, reported negative correlations between BMI and AMH. However, strength of the correlations were weak (mostly less than 0.3). Four out of 6 studies on PCOS women, 1 out of 3 on infertile women, and 2 out of the 7 on fertile non-PCOS women reported a significant lower AMH level in obese than in non-obese women. **Conclusion:** The association between BMI and ovarian reserve is not clear according to the current findings.

Keywords: Obesity, Body mass index, Anti-mullerian hormone, AMH, Ovarian reserve