

## مقایسه‌ی آثار تمرینات استقامتی پرشدت و مقاومتی بر سطوح

### آیریزینی و شاخص مقاومت انسولینی در موش صحرایی

دکتر رحمان سوری، دکتر علی اصغر رواسی، سعید حضرتی مولائی

دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران، نشانی مکاتبه‌ی نویسنده‌ی مسئول: تهران، امیرآباد شمالی، دانشکده تربیت بدنی

دانشگاه تهران، ساختمان ظفر، دکتر رحمان سوری؛ e-mail: soorirahman@yahoo.com

#### چکیده

**مقدمه:** آیریزین مایوکاینی است که از پروتئین غشایی FNDC5 آزاد می‌گردد و تاثیرات مثبتی بر متابولیسم دارد. هدف از تحقیق حاضر، مقایسه‌ی تأثیر تمرین‌های استقامتی پرشدت و مقاومتی بر آیریزین و مقاومت انسولینی در موش‌های صحرایی نز بود. **مواد و روش‌ها:** ۲۴ سر موش صحرایی نز به طور تصادفی به گروه‌های تمرین استقامتی پرشدت، مقاومتی و کنترل تقسیم شدند. تمرین استقامتی شدید به مدت ۱۰ هفته روی ترمیم انجام شد. تمرین مقاومتی شامل بالا رفتن از نرده‌بان با وزنهای آویزان شده به دم حیوان بود. پس از ۱۰ هفته تمرین، غلظت سرمی آیریزین، گلوکز و انسولین اندازه‌گیری شد. **یافته‌ها:** سطوح سرمی آیریزین پس از ۱۰ هفته تمرین استقامتی پرشدت در مقایسه با تمرین مقاومتی به طور معنی‌داری افزایش یافت ( $P=0.008$ ) و مقادیر گلوکز ( $P=0.001$ ) و شاخص مقاومت انسولینی ( $P=0.009$ ) در موش‌های گروه تمرین استقامتی شدید به طور معنی‌داری کمتر از گروه تمرین مقاومتی بود. همچنین، گلوکز و شاخص مقاومت انسولینی موش‌های گروه تمرین استقامتی شدید به طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود. از طرفی، وزن موش‌ها در گروه تمرین استقامتی شدید به طور معنی‌داری کاهش یافت ( $P=0.008$ ). در ضمن، بین آیریزین با گلوکز و شاخص مقاومت انسولینی همبستگی منفی معنی‌داری مشاهده شد، ولی ارتباط معنی‌داری بین آیریزین با انسولین وجود نداشت. **نتیجه‌گیری:** تمرینات استقامتی پرشدت در افزایش مقدار آیریزین و کاهش مقدار گلوکز و شاخص مقاومت انسولینی، در مقایسه با تمرین مقاومتی؛ موثرتر هستند.

**واژگان کلیدی:** تمرین استقامتی پرشدت، تمرین مقاومتی، آیریزین، مقاومت انسولینی، موش صحرایی

دریافت مقاله: ۹۴/۳/۱۱ - ۹۳/۱۲/۲۸ - دریافت اصلاحیه: ۹۴/۳/۱۱ - پذیرش مقاله: ۹۴/۳/۱۱

اصلی‌ترین عوامل ارتباط بین عضله اسکلتی و بافت چربی است و در برخی مطالعات مشاهده شده که می‌تواند بافت چربی سفید را که منبع نخیره انرژی در بدن است به بافت چربی قهوه‌ای که مصرف کننده انرژی (از طریق گرمایش) است، تبدیل کند.<sup>۲</sup>

پروتئین FNDC5<sup>ii</sup> که یک پروتئین غشایی است، پس از جدا شدن از غشا و تجزیه، به صورت آیریزین در خون رها می‌شود و پس از رسیدن به سلول هدف موجب افزایش بیان

#### مقدمه

در یک دهه گذشته که عضلات اسکلتی به عنوان یکی از ارگان‌های درون‌ریز شناخته شده‌اند، بسیاری از نگاه‌ها را به خود جلب کرده‌اند.<sup>۱</sup> هورمون‌های ترشح شده از عضلات اسکلتی که مایوکاین<sup>۱</sup> نامیده می‌شوند، تاثیرات متفاوتی بر سیستم‌های مختلف بدن بر جای می‌گذارند.<sup>۲</sup> آیریزین نوعی مایوکاین است که تازه یافت شده است و گفته می‌شود در اثر فعالیت عضلانی و ورزش تولید می‌شود، به عنوان یکی از

انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که پاسخ سطح سرمی آیریزین به تمرین پرشدت بیشتر است.<sup>۱۰</sup>

با توجه به نتایج به دست آمده از تمامی پژوهش‌های انجام شده در مورد سطح سرمی آیریزین و مقاومت انسولینی، در این پژوهش تجربی قصد داشتیم برای اولین بار پاسخ سطح سرمی آیریزین و مقاومت انسولینی به ۱۰ هفته تمرین به دو شیوه مقاومتی و استقامتی شدید را در موش‌های صحرایی نر مورد بررسی قرار دهیم تا از طرفی تاثیر تمرین پرشدت در بلندمدت را مورد ارزیابی قرار داده و از طرفی تفاوت پاسخ به دو شیوه مختلف تمرینی را بررسی نماییم.

## مواد و روش‌ها

پژوهش حاضر از نوع تجربی بود که با هدف کلی مقایسه‌ی تاثیر اجرای ۱۰ هفته تمرین استقامتی پرشدت و مقاومتی بر سطح سرمی آیریزین، انسولین، گلوکز و شاخص مقاومت انسولینی در موش‌های صحرایی سالم اجرا شد. در ابتدا، ۲۴ سر موش صحرایی نر نژاد ویستان (میانگین وزن  $۱۷۹\pm ۱۳$  و سن  $۶$  هفته‌ای) از مرکز تکثیر و پروش حیوانات آزمایشگاهی پاستور تهیه و به آزمایشگاه حیوانات دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی منتقل گردید. حیوانات در گروه‌های  $۴$  تایی و در قفس‌های پلی‌کربنات در شرایط کنترل شده با میانگین دمای  $۲۲\pm ۱/۷$  درجه سانتی‌گراد و چرخه روشناهی - تاریکی  $۱۲:۱۲$  ساعت و با دسترسی آزاد به آب و غذای ویژه‌ی حیوانات آزمایشگاهی نگهداری شدند و در تمامی مراحل انجام پژوهش با رعایت اصول اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی با آن‌ها رفتار شد. پس از  $۲$  هفته آشناسازی با محیط آزمایشگاه و آشنایی با شیوه‌ی تمرین (دویین روی نوارگردان و بالا رفتن از نزدیان مخصوص تمرینات مقاومتی حیوانات آزمایشگاهی) و رسیدن به وزن مطلوب، موش‌ها با میانگین وزن  $۱۹۸\pm ۱۶$  گرم به طور تصادفی به  $۳$  گروه تمرین استقامتی پرشدت ( $۸$  سر)، گروه مقاومتی ( $۸$  سر) و گروه کنترل ( $۸$  سر) تقسیم شدند (جدول  $۳$ ). پس از آن، موش‌های گروه تمرین خود قرار گرفتند در حالی که گروه کنترل فقط در قفس نگهداری می‌شدند و در تمرین شرکت نمی‌کردند.

پروتکل تمرین دوی استقامتی پرشدت شامل  $۵$  جلسه تمرین بر روی تردیمیل در طول هفته بود که طی  $۱۰$  هفته به

ژن پروتئین جداساز نوع  $۱$  (UCP1)<sup>i</sup> می‌گردد و در نهایت این پروتئین سبب القاء خاصیت بافت چربی قهوه‌ای در بافت چربی سفید می‌شود.

بوستروم<sup>ii</sup> و همکارانش برای اولین بار در سال  $۲۰۱۲$  در هنگام مطالعه بر روی PGC1α<sup>iii</sup> که یک فعال‌ساز نسخه‌بردار است و در اثر فعالیت بدنی افزایش می‌یابد و همچنین بیان ژن FNDC5 را افزایش می‌دهد، مایوکاین جدیدی را کشف کردند و آن را آیریزین نامیدند. آن‌ها سپس با مطالعه رفتار این مایوکاین بیان داشتند که آیریزین یکی از دلایل اصلی قهوه‌ای شدن بافت چربی سفید است که در اثر ورزش مقدار آن افزایش می‌یابد و همچنین از چاقی و مقاومت انسولینی که از اختلالات بیماری دیابت است، جلوگیری می‌کند.<sup>۴</sup> Timmons<sup>iv</sup> و همکارانش در سال  $۲۰۱۲$  با مطالعه بر روی دو گروه تمرینی مختلف که یکی به مدت  $۶$  هفته و دیگری  $۲۶$  هفته تمرین کرده بودند، افزایش سطح آیریزین در اثر ورزش را رد کردند و کاهش مقدار مقاومت انسولینی و کاهش وزن را نه در اثر آیریزین بلکه ناشی از آثار مفید تمرین و سایر عوامل دانستند.<sup>۴</sup>

پس از این دو پژوهش، مطالعات فراوانی در مورد تاثیر فعالیت بدنی بر آیریزین انجام شدند و نتایج متفاوتی نیز حاصل شدند. برخی تاثیر مثبت فعالیت بدنی را تایید کردند و برخی تغییری در سطح سرمی آیریزینی مشاهده نکردند. بررسی مطالعات انجام شده نشان داد همه پژوهش‌هایی که تاثیرات حاد فعالیت بدنی بر سطح سرمی آیریزین را مورد ارزیابی قرار داده بودند، افزایش مقدار سرمی آیریزین در اثر فعالیت بدنی را تایید می‌کردند، ولی تحقیقاتی که تاثیرات مزمن فعالیت بدنی و ورزش را بر سطح سرمی آیریزین مورد ارزیابی قرار داده بودند، دارای تناظرها بیان نیز بودند، حتی در برخی موارد کاهش مقدار آیریزین در اثر فعالیت بدنی مشاهده شد.<sup>۵-۱۴</sup>

شدت فعالیت بدنی نیز یکی از موارد مورد بحث در ارتباط با تاثیرات فعالیت بدنی بر سطح سرمی آیریزین بود؛ به عنوان مثال تسوجیا<sup>v</sup> و همکارانش در سال  $۲۰۱۴$  مقایسه‌ای برای تاثیر دویین بر روی تردیمیل با شدت متفاوت بر سطح سرمی آیریزین، در دو حالت  $۴۰$  و  $۸۰$  درصد VO<sub>2max</sub>

i- Uncoupling Protein 1

ii- Boström

iii - Peroxisome Proliferator-activated Receptor Gamma Coactivator 1-alpha

iv- Timmons

v- Tsuchiya

ویژه جوندگان آزمایشگاهی ساخت شرکت پیشرو اندیشه صنعت انجام شد. این دستگاه دارای ۱۰ خط مجزا بود که به طور همزمان هر ۸ موش در داخل دستگاه قرار داده شده و به تمرین می‌پرداختند.

طور فزاینده‌ای بر مدت و شدت تمرین افزوده می‌شد تا در انتهای هفته‌ی دهم به مدت یک ساعت با سرعت ۳۴ متر بر دقیقه رسید. همه جلسات تمرینی شامل ۷ تا ۱۰ دقیقه گرم کردن و سرد کردن بود (جدول ۱). تمرینات دو روی تردمیل

#### جدول ۱- پروتکل تمرین استقامتی پرشدت

ساعت تردمیل (متر/دقیقه)	مدت تمرین (دقیقه)	تعداد جلسات در هفته	۱۰ هفته	۹ هفته	۸ هفته	۷ هفته	۶ هفته	۵ هفته	۴ هفته	۳ هفته	۲ هفته	۱ هفته
۲۴	۳۴	۳۰	۲۰	۲۰	۲۸-۲۰	۲۸	۲۸-۲۵	۲۵	۲۵-۲۰	۲۰		
۶۰	۵۵	۵۰-۵۵	۵۰	۴۵-۵۰	۴۵	۴۵-۴۰	۴۰	۴۰-۳۵	۳۵-۳۰			
۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۱	

که حیوان نمی‌توانست ۱۰ تکرار را به اتمام برساند از وزنه‌ی تمرینی جلسه‌ی پیشین استفاده می‌شد تا ۱۰ تکرار کامل شود. شرط افزودن بر وزنه کامل کردن ۱۰ تکرار با یک وزنه‌ی مشخص بود.  
نرdban مخصوص تمرینات مقاومتی جوندگان به ارتفاع ۱ متر و فاصله‌ی پله‌ها ۲ سانتی‌متر از یکدیگر و شیب ۹۰ درجه بود.

پروتکل تمرین مقاومتی شامل ۳ جلسه تمرین روی نرdban در طول هفته بود. در ابتدای تمرین مقاومتی به منظور گرم کردن، موش‌ها سه بار بدون وزنه و بدون استراحت بین تکرارها از نرdban بالا می‌رفتند. بار اولیه برای شروع تمرین مقاومتی ۵۰ درصد وزن بدن حیوان بود. در ابتدای هر جلسه‌ی تمرینی پس از وزن‌کشی حیوان، ۱۵ درصد وزن بدن حیوان بر وزنه افزوده می‌شد و در صورتی

#### جدول ۲- پروتکل تمرین مقاومتی

تعداد هفت	دوره	تکرار	بار	استراحت	تعداد جلسات
۱۰	۱	۱	۰.۵٪ وزن بدن موش + ۱۵٪ وزن بدن	۲ دقیقه	۲ جلسه در هفته

کشور چین و کیت انسولین Mercodia ساخت کشور سوئد به ترتیب با حساسیت ۰/۱۵۶ و ۰/۰۱۵ نانوگرم در میلی‌لیتر و ۰/۰۱۵ میکروگرم در لیتر انجام شد. غلظت گلوکز سرمی نیز به روش کلوگزاسیداز و با استفاده از کیت اندازه‌گیری پارس آزمون ساخت کشور ایران اندازه‌گیری شد و شاخص مقاومت انسولینی نیز با استفاده از معادله ذیل محاسبه گردید:<sup>۱۵</sup>

HOMA-IR =  $\frac{\text{گلوکز} \times (\text{میکرو واحد}/\text{میلی لیتر})}{(\text{میلی مول}/\text{لیتر})}$  ناشتا  $= \frac{22/5}{22/5}$

اطلاعات به دست آمده بر اساس میانگین و انحراف معیار دسته‌بندی و توصیف شدن. برای ارزیابی طبیعی بودن توزیع داده‌ها از آزمون آماری شاپیرو-ویک استفاده شد. تغییرات بین گروهی گروه‌های تجربی و کنترل با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک سویه ارزیابی گردیدند و بعد از مشخص شدن معنی‌داری از آزمون تعقیبی LSD

در پژوهش حاضر به دلیل سنجش تاثیرات مزمن ورزش و جلوگیری از هر گونه اثر حاد فعالیت ورزشی (از جمله فاکتورهای التهابی)، خون‌گیری‌ها ۴۸ ساعت پس از تمرین انجام شد تا فقط تاثیرات سازگاری به تمرین پس از ده هفته مشخص شود نه تاثیرات حاد و آنی یک جلسه تمرین، زیرا با توجه به منابع موجود، تاثیرات حاد ناشی از یک جلسه تمرین شدید در نهایت پس از ۴۸ ساعت به حالت پایه باز می‌گردد. با بیهوش نمودن حیوان از طریق اتر، خون‌گیری از قلب حیوان و با سرنگ ۵ میلی‌لیتر انجام شد و پس از انتقال نمونه‌ها به داخل لوله‌های از پیش شماره‌گذاری شده، سرم‌ها با استفاده از ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ با سرعت ۱۰۰۰ دور در دقیقه جدا شدند و نمونه‌ها برای سایر اندازه‌گیری‌ها در دمای ۸۰-درجه‌ی سانتی‌گراد فریز شدند.

اندازه‌گیری سطوح سرمی آیریزین و انسولین توسط روش الایزا و با استفاده از کیت آیریزین Cusabio ساخت

## یافته‌ها

مقایسه نتایج یافته‌های مربوط به وزن هفته اول و هفته دهم نشان داد تفاوت معنی‌داری بین وزن موش‌های گروه تمرین استقامتی پرشدت و کنترل در پی ۱۰ هفته تمرین تناوبی پرشدت به وجود می‌آید ( $P=0.008$ ). وزن گروه تمرین مقاومتی پس از ده هفته تفاوت معنی‌داری با وزن گروه کنترل نداشت (جدول ۲).

برای یافتن اختلاف بین گروه‌ها استفاده شد. روابط همبستگی نیز با کمک آزمون همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS ویراست ۲۰ در سطح معنی‌داری آماری کمتر ۰/۰۵ انجام شد.

جدول ۳- نتایج مربوط به وزن موش‌ها در هفته‌ی اول و هفته‌ی دوازدهم

وزن هفته‌ی دهم (گرم)	وزن هفته‌ی اول (گرم)	
۲۲۲/۳۷±۳۱/۴۸	۱۹۹/۵۰±۱۶/۹۱	گروه کنترل
* ۲۸۶/۱۲±۲۰/۹۶	۱۹۹/۷۵±۱۸/۰۳	گروه استقامتی پرشدت
۳۰۰/۲۵±۲۰/۴۶	۱۹۷/۲۵±۱۸/۲۱	گروه مقاومتی

داده‌ها به صورت میانگین±انحراف معیار ارایه شده‌اند. \* تغییر معنی‌دار نسبت به گروه کنترل ( $P=0.008$ )

به طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود. علاوه بر این، مقدار میانگین گلوکز سرمی ( $P=0.001$ ) و شاخص مقاومت انسولینی ( $P=0.009$ ) در گروه تمرین استقامتی پرشدت به طور معنی‌داری کمتر از گروه تمرین مقاومتی بود. بررسی سایر شاخص‌ها تفاوت معنی‌داری را میان گروه‌های مختلف نشان نداد (جدول ۴).

یافته‌های پژوهش پیرامون تغییرات سطح سرمی آیریزین، گلوکز، انسولین و شاخص مقاومت انسولینی نشان داد که سطوح سرمی آیریزین گروه تمرین استقامتی پرشدت به طور معنی‌داری بیش از گروه تمرین مقاومتی بود ( $P=0.008$ ). در گروه تمرین استقامتی پرشدت سطوح گلوکز سرمی ( $P=0.001$ ) و شاخص مقاومت انسولینی ( $P=0.001$ )

جدول ۴- نتایج مربوط به متغیرهای بیوشیمیابی

شاخص مقاومت انسولینی	گلوکز (میلی‌گرم/صد میلی‌لیتر)	انسولین (میکرو واحد/میلی‌لیتر)	آیریزین (نانوگرم/میلی‌لیتر)	
۲/۱۱	۱۴۴/۶۲	۸/۶۹	۶/۶۲	گروه کنترل
* ۰/۸۷*	۶۰/۲۵*	۵/۶۹	۸/۳۵*	گروه استقامتی پرشدت
۲/۴۸	۱۴۰/۱۲	۷/۱۹	۵/۶۸	گروه مقاومتی

داده‌ها به صورت میانگین ارایه شده‌اند. \* تغییر معنی‌دار نسبت به گروه کنترل ( $P<0.05$ ).  $\ddagger$  تغییر معنی‌دار نسبت به گروه مقاومتی ( $P<0.05$ ).

وجود داشت ( $P=0.034$ ,  $t=-0.434$ ) ولی ارتباط بین آیریزین با وزن و انسولین معنی‌دار نبود (جدول ۵).

بنابر یافته‌های آزمون همبستگی پیرسون، بین سطوح آیریزین و شاخص مقاومت انسولینی ( $P=0.015$ ,  $t=-0.492$ ) و بین سطوح آیریزین و گلوکز همبستگی منفی معنی‌دار

جدول ۵- نتایج مربوط به آزمون همبستگی پیرسون بین آیریزین و سایر شاخص‌ها

شاخص مقاومت انسولینی	گلوکز	انسولین	وزن هفته دهم	وزن هفته اول	
* ۰/۴۹۲*	-۰/۴۲۴*	-۰/۲۵۶	-۰/۰۶۲	۰/۲۰۹	$r$
۰/۰۱۵	۰/۰۳۴	۰/۰۸۸	۰/۷۷۴	۰/۳۷۷	p

\* همبستگی معنی‌دار در سطح  $P<0.05$

## بحث

شدت‌های بالاتر تمرينی سبب افزایش بیشتر سطح سرمی آيریزین می‌شوند<sup>۱۰,۱۱</sup> و با توجه به بالاتر بودن شدت تمرينات استقامتی نسبت به تمرين مقاومتی در اين پژوهش، می‌توان آن را به عنوان اصلی‌ترین دليل تفاوت در نتيجه‌ها در نظر گرفت.

در پژوهش‌هایی که به بررسی توامان آيریزین و مقاومت انسولینی پرداخته‌اند، اغلب موارد از تاثیر متقابل اين دو عامل بر هم صحبت کرده‌اند.<sup>۱۲-۱۶</sup> بوستروم و همکارانش به عنوان پایه‌گذاران پژوهش‌های مرتبط با آيریزین، با ابتلای گروهی از موش‌ها به چاقی و دیابت و تزریق FNDC5 به آن‌ها، تاثیر مثبت آيریزین بر چاقی و شاخص مقاومت انسولینی را تایید کردند.<sup>۱۷</sup> در پژوهش حاضر نیز با بررسی مقدار سرمی گلوکز، انسولین و شاخص مقاومت انسولینی و ارتباط بين سطح سرمی آيریزین با اين عوامل مشخص شد که مقدار هر سه متغير در گروه‌های تمرينی كمتر از گروه كنترل است و ارتباط معنی‌داری بين آيریزین با گلوکز و شاخص مقاومت انسولینی وجود دارد، که اين نتایج دقیقاً مشابه با يافته‌های بوستروم و همکارانش است.

تیمونز و همکارانش در سال ۲۰۱۲ هر چند در مورد آيریزین با بوستروم و همکارانش مخالف بودند، ولی بهبود شاخص مقاومت انسولینی در اثر تمرين را تایید کردند. البته آن‌ها دليل دیگری را در کاهش شاخص مقاومت انسولینی و متغيرهای متابولیکی دخیل دانستند و ارتباط بين آيریزین و مقاومت انسولین را رد کردند.<sup>۱۸</sup> هر چند بخشی از يافته‌های پژوهش حاضر نیز با نتایج پژوهش تیمونز يکسان است، ولی ارتباط بين آيریزین و مقاومت انسولینی را نمی‌توان رد کرد و همان‌طور که بوستروم در جواب به تیمونز توضیح داده، روش سنجش متفاوت تیمونز را می‌توان دلیلی برای وجود این اختلاف در پژوهش‌ها دانست.

چویی<sup>iii</sup> و همکارانش در سال ۲۰۱۳ میزان سطوح سرمی آيریزین افراد در آستانه دیابت نوع ۲ را مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند که مقدار اين مایوکاین با پیشرفت بیماری دیابت کاهش می‌يابد که اين‌ها، نتایج حاصل از پژوهش حاضر را تصدیق می‌کند. در پژوهش چویی نیز ارتباط بين انسولین و آيریزین معنی‌دار نبود، ولی گلوکز به طور معنی داری با آيریزین همبستگی منفی داشت که اين نتایج در پژوهش حاضر نیز مشاهده شد.<sup>۱۹</sup>

پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر تمرين استقامتی پرشدت و مقاومتی بر سطح سرمی آيریزین و شاخص مقاومت انسولینی در موش‌های صحرایی نر انجام گرفت. همان‌طور که يافته‌های پژوهش نشان داد تمرين استقامتی پرشدت در مقایسه با تمرين مقاومتی، موثرتر بود، چون به طور معنی‌داری سبب افزایش سطح سرمی آيریزین و کاهش سطح سرمی گلوکز و شاخص مقاومت انسولینی شده بود. از طرفی، وزن گروه تمرين استقامتی پرشدت نیز در مقایسه با هر دو گروه تمرين مقاومتی و كنترل به طور معنی‌داری پايان‌تر بود.

با مقایسه گروه‌های تجربی با گروه كنترل می‌توان نتيجه گرفت هیچ کدام از دو روش تمرينی، سبب افزایش دراز مدت سطح سرمی آيریزین نمی‌شود. اين يافته با نتایج پژوهش تیمونز و همکارانش، هو<sup>i</sup> و همکارانش، نورهیم<sup>ii</sup> و همکارانش همکارانش و بسیاری از پژوهش‌های دیگر همسو است.<sup>۲۰,۲۱</sup> البته اين نتایج با يافته‌هایی که بوستروم و همکارانش به عنوان پژوهشگران پیشرو در اين زمینه به دست آورده‌اند متفاوت است.<sup>۲۲</sup>

بوستروم و همکارانش در سال ۲۰۱۲ پس از انجام ۱۴ روز شنای استقامتی و دویدين روی چرخ گردان بر موش‌ها و همچنان ۱۰ هفته تمرين استقامتی نمونه‌های انسانی، افزایش سطح سرمی آيریزین در اثر تمرين را مشاهده کردند.<sup>۲۳</sup> ابهامی که در مورد اين پژوهش وجود دارد، مشخص نبودن زمان خون‌گیری آن است و می‌توان اين مساله را دليلی برای متناقض بودن يافته‌های اين تحقیق با سایر تحقیقات انجام شده در این حوزه دانست. زیرا با توجه به سایر پژوهش‌ها در صورتی که در اين پژوهش نیز خون‌گیری دقیقاً پس از تمرين انجام گرفته باشد، اين نتیجه تاثیر حاد ورزش بر آيریزین بوده و نمی‌توان آن را حاصل ۱۴ روز یا ۱۰ هفته تمرين استقامتی دانست.

البته در صورت مقایسه دو گروه تمرينی با يکيگر، تمرين استقامتی شدید به طور معنی‌داری سبب افزایش سطح سرمی آيریزین شد، که دليل اين تفاوت را می‌توان شدت تمرين دانست. با توجه به پژوهش‌های انجام شده، شدت تمرين از اصلی‌ترین عوامل تاثيرگذار بر آيریزین است و

i- Huh

ii- Norheim

نبودن هر زینه انژی در اثر دو شیوه تمرینی مختلف، و تاثیر اثر روی شاخص‌های خونی و آنزیمی را می‌توان به عنوان محدودیت‌های پژوهش حاضر دانست.

از یافته‌های این مطالعه نتیجه‌گیری می‌شود که تمرین استقامتی پرشدت در مقایسه با تمرین مقاومتی سبب افزایش معنی‌دار غلظت سرمی آیریزین می‌شود. علاوه بر این، تمرین استقامتی پرشدت مقدار شاخص مقاومت انسولینی را به طور معنی‌داری کاهش می‌دهد، ولی تمرین مقاومتی اثر چندانی بر این شاخص نمی‌گذارد.

i-Liu

## References

1. Raschke S, Eckel J. Adipo-myokines: two sides of the same coin—mediators of inflammation and mediators of exercise. *Mediators Inflamm* 2013; 2013: 320724.
2. Roca-Rivada A, Castelao C, Senin LL, Landrove MO, Baltar J, Belen Crujeiras A, et al. FNDC5/irisin is not only a myokine but also an adipokine. *PloS one* 2013; 8: e60563.
3. Boström P, Wu J, Jedrychowski MP, Korde A, Ye L, Lo JC, et al. A PGC1 $\alpha$  dependent myokine that drives brown-fat-like development of white fat and thermo genesis. *Nature* 2012; 481: 463-8.
4. Timmons JA, Baar K, Davidsen PK, Atherton PJ. Is irisin a human exercise gene? *Nature* 2012; 488: E9-E10.
5. Lecker SH, Zavin A, Cao P, Arena R, Allsup K, Daniels KM, et al. Expression of the irisin precursor FNDC5 in skeletal muscle correlates with aerobic exercise performance in patients with heart failure. *Circ Heart Fail* 2012; 5: 812-8.
6. Huh JY, Panagiotou G, Mougios V, Brinkoetter M, Vamvini MT, Schneider BE, et al. FNDC5 and irisin in humans: I. Predictors of circulating concentrations in serum and plasma and II. mRNA expression and circulating concentrations in response to weight loss and exercise. *Metabolism* 2012; 61: 1725-38.
7. Reisi J, Rajabi H, Ghaedi K, Marandi SM, Dehkhoda MR. Effect of Acute Resistance Training on Plasma Irisin Protein Level and Expression of Muscle FNDC5 and Adipose Tissue UCP1 Genes in Male Rats. *J Isfahan Med Sch* 2013; 31: 1657-66.
8. Kraemer R, Shockett P, Webb ND, Shah U, Castracane VD. A transient elevated irisin blood concentration in response to prolonged, moderate aerobic exercise in young men and women. *Horm Metab Res* 2014; 46: 150-4.
9. Aydin S, Aydin S, Kugulu T, Yilmaz M, Kalayci M, Sahin İ, et al. Alterations of irisin concentrations in saliva and serum of obese and normal-weight subjects, before and after 45 min of a Turkish bath or running. *Peptides* 2013; 50: 13-8.
10. Tsuchiya Y, Ando D, Goto K, Kiuchi M, Yamakita M, Koyama K. High-Intensity Exercise Causes Greater Irisin Response Compared with Low-Intensity Exercise under Similar Energy Consumption. *Tohoku J Exp Med* 2014; 233: 135-40.
11. Daskalopoulou SS, Cooke AB, Gomez YH, Mutter AF, Filippaios A, Mesfum ET, et al. Plasma irisin levels progressively increase in response to increasing exercise workloads in young, healthy, active subjects. *Eur J Endocrinol* 2014; 171: 343-52.
12. Norheim F, Langleite TM, Hjorth M, Holen T, Kielland A, Stadheim HK, et al. The effects of acute and chronic exercise on PGC1 $\alpha$ , irisin and browning of subcutaneous adipose tissue in humans. *FEBS J* 2014; 281: 739-49.
13. Pekkala S, Wiklund PK, Hulmi JJ, Ahtiainen JP, Horttanainen M, Pöllänen E, et al. Are skeletal muscle FND C5 gene expression and irisin release regulated by exercise and related to health? *J Physiol* 2013; 591: 5393-400.
14. Hecksteden A, Wegmann M, Steffen A, Kraushaar J, Morsch A, Ruppenthal S, et al. Irisin and exercise training in humans-Results from a randomized controlled training trial. *BMC Med* 2013; 11: 235.
15. Matthews D, Hosker J, Rudenski A, Naylor B, Treacher D, Turner R. Homeostasis model assessment: insulin resistance and beta-cell function from fasting plasma glucose and insulin concentrations in man. *Diabetologia* 1985; 28: 412-9.
16. Crujeiras AB, Pardo M, Arturo RR, Navas-Carretero S, Zulet MA, Martínez JA, et al. Longitudinal variation of circulating irisin after an energy restriction-induced weight loss and following weight regain in obese men and women. *Am J Hum Biol* 2014; 26: 198-207.
17. Park KH, Zaichenko L, Brinkoetter M, Thakkar B, Sahin-Efe A, Joung KE, et al. Circulating irisin in relation to insulin resistance and the metabolic syndrome. *J Clin Endocrinol Metab* 2013; 98: 4899-907.
18. Sesti G, Andreozzi F, Fiorentino TV, Mannino GC, Sciacqua A, Marini MA, et al. High circulating irisin levels are associated with insulin resistance and vascular atherosclerosis in a cohort of nondiabetic adult subjects. *Acta Diabetol* 2014; 51: 705-13.
19. Choi YK, Kim MK, Bae KH, Seo H, Jeong JY, Lee WK, et al. Serum irisin levels in new-onset type 2 diabetes. *Diabetes Res Clin Pract* 2013; 100: 96-101.
20. Liu JJ, Wong MD, Toy WC, Tan CS, Liu S, Ng XW, et al. Lower circulating irisin is associated with type 2 diabetes mellitus. *J Diabetes Complications* 2013; 27: 365-9.

لیو و همکارانش در سال ۲۰۱۳ با بررسی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ و مقایسه آن با افراد سالم از پایین بودن سطح سرمی آیریزین در مبتلایان به دیابت خبر دادند. در این پژوهش نیز ارتباط معنی‌دار بین گلوکز و آیریزین تایید شد، ولی ارتباط بین آیریزین و مقاومت انسولین معنی‌دار نبود.<sup>۲۰</sup> که مبتلا بودن نمونه‌های این پژوهش به دیابت را می‌توان یکی از دلایل تفاوت این مورد با نتایج تحقیق حاضر دانست. علی‌رغم این که در تحقیق حاضر، ویژگی‌های جسمانی (گونه، نژاد و سن)، عوامل محیطی (نور، دما، رطوبت) و کنترل غذایی در اختیار محقق بود، اما عواملی چون برابر

**Original Article**

# Comparing the Effects of High Intensity Endurance Training and Resistance Training on Irisin Levels and Insulin Resistance in Rats

Soori R, Ravasi AA, HazratiMolaee S

Department of Sports and Exercise Physiology, Faculty of Sports and Exercise Sciences, University of Tehran,  
Tehran, I.R. Iran

e-mail: soori@ut.ac.ir

Received: 17/02/2015 Accepted: 01/06/2015

**Abstract**

**Introduction:** Irisin is a myokine released from a membrane protein FNDC5 and has positive effects on metabolism. The aim of this study was to compare the effect of high intensity endurance training (HIET) and resistance training (RT) on serum irisin and the insulin resistance index in male rats. **Materials and Methods:** Twenty-four male rats were randomly divided into the high intensity endurance training (HIET), resistance training (RT) and control groups; HIET was conducted on a treadmill for 10 weeks, while RT consisted of climbing a ladder carrying a load suspended from the tail. After 10 weeks of training, serum concentration of irisin, glucose and insulin were measured. **Results:** Irisin serum levels increased significantly following 10 weeks of HIET, compared with RT ( $P=0.008$ ). Glucose levels ( $P=0.001$ ) and insulin resistance index ( $P=0.009$ ) in the HIET group were significantly lower than the RT group and the control group as well ( $P=0.001$ ). In addition, high intensity endurance training decreased the body weight of the HIET group significantly ( $P=0.008$ ). Also, Irisin was found to have a significant negative correlation with glucose and insulin resistance index, whereas no significant relationship was seen between irisin and insulin. **Conclusion:** Compared to resistance training, HIET is more effective in increasing irisin and the decreasing glucose and the insulin resistance index.

**Keywords:** High Intensity Endurance Training, Resistance Training, Irisin, Insulin Resistance, Rat