

## بررسی سن منارک و عوامل مرتبط با آن در دختران ایرانی شرکت کننده در المپیاد ورزشی دانش‌آموزی سال ۱۳۸۱

دکتر علی کبیر<sup>۱</sup>، دکتر فرزانه ترکان<sup>۲</sup>، دکتر لاله حاکمی<sup>۳</sup>

(۱) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران؛ (۲) انجمن پزشکی - ورزشی اداره کل تربیت بدنی دختران آموزش و پرورش؛ (۳) فدراسیون پزشکی - ورزشی، نشانی مکاتبه‌ی نویسنده‌ی مسئول: تهران، ستارخان، کوچه آقا رحیمی، پلاک ۷۲، طبقه دوم، کد پستی ۱۴۵۵۸۵۳۵۸۳ e-mail:aikabir@yahoo.com

### چکیده

مقدمه: پیش‌بینی زمان صحیح بلوغ در دختران باعث می‌شود بتوان آگاهی‌های لازم را در این زمینه به موقع به آنان ارائه داد و آنها را از نظر روحی برای پذیرش تحولاتی که در این دوره تجربه خواهند کرد، آماده ساخت. در ایران هنوز مطالعه‌ای جامع در این زمینه صورت نگرفته است. مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی - توصیفی روی ۶۲۹ دختر از ۲۴ استان کشور انجام شد. فرم جمع‌آوری اطلاعات (شامل سن دقیق شروع اولین عادت ماهیانه)، به کمک یکی از افراد خانوارde تکمیل شد. مرحله‌ی بلوغ از نظر تلارک و پوبارک و درصد چربی به وسیله‌ی شرح حال و معاینه‌ی پزشکی تعیین شد. به منظور تخمین سن بلوغ در این افراد، از مدل رگرسیونی خطی استفاده شد. یافته‌ها: در ۴۵۴ نفر که منارک آنها شروع شده بود؛ میانگین سن شروع قاعدگی ۱۳/۱۸±۰/۰۶ سال (۱۵۸/۲±۰/۷ ماه) بود. میانگین سن شروع قاعدگی مادریزگرها و مادران این ۴۵۴ نفر به ترتیب ۱۲/۹±۰/۲۵ و ۱۳/۶±۰/۱۴ سال بود. منارک زودرس در افراد دارای قد کوتاهتر ( $p=0/001$ )، شروع ورزش در سنین پایین‌تر ( $p=0/019$ )، تعداد خواهر کمتر ( $p=0/007$ )، تعداد برادر کمتر ( $p=0/003$ )، درصد چربی بدن بیشتر ( $p=0/037$ )، نمایه‌ی توده‌ی بدن بیشتر ( $p=0/002$ )، ساکنان مناطق کوهپایه‌ای ( $p=0/001$ ) و کسانی که اولین منارک آنها در فصل بهار شروع شده بود ( $p=0/047$ ) دیده شد. مدل رگرسیونی نشان داد که سن منارک با استفاده از متغیرهای قد فعلی ( $p<0/001$ )، ارتفاع محل زندگی از سطح دریا ( $p=0/001$ )، تعداد برادر ( $p=0/006$ ) و تعداد خواهر ( $p=0/008$ ) قابل پیش‌بینی است ( $r^2=0/99$ ). نتیجه‌گیری: قد کوتاهتر افراد، بعد خانوار کمتر و ساکن بودن در مناطق کوهپایه‌ای مهم‌ترین عوامل پیشگویی کننده‌ی شروع زودرس منارک است. به نظر می‌رسد که بعد از کاهش معنی‌دار سن منارک به علت بهبود کیفیت تغذیه‌ی دختران جوان طی دهه‌های اخیر، امروزه سیر فراینده‌ی آن می‌تواند ناشی از عادات تغذیه‌ای ضعیف و نحوه‌ی زندگی کم تحرک و یا پاسخی به افزایش استرس‌های فیزیکی و روانی باشد.

وازگان کلیدی: سن منارک، ورزشکار، زنان

دریافت مقاله: ۸۵/۹/۱۸ - دریافت اصلاحیه: ۸۵/۹/۴ - پذیرش مقاله: ۸۵/۹/۹

### مقدمه

توانایی تولد فرزندانی سالم را داشته و روحیه‌ی با طراوت آنها، باعث سرایت تازگی و نشاط در جامعه می‌شود.<sup>۱</sup>

وجود زنان سالم و با نشاط مایه‌ی سلامتی جسم و روح افراد جامعه خواهد شد، زیرا مادرانی سالم خواهند شد که

تهران (۹ نفر)، فارس (۱۲ نفر)، هرمزگان (۱۸ نفر)، بوشهر (۲۰ نفر)، خوزستان (۷۹ نفر)، آذربایجان شرقی (۴۲ نفر)، آذربایجان غربی (۱۰ نفر)، کرمانشاه (۲۹ نفر)، سیستان و بلوچستان (۹ نفر)، مرکزی (۱۰ نفر)، قزوین (۱۸ نفر)، لرستان (۱۹ نفر)، اصفهان (۱۹ نفر)، سمنان (۱۴ نفر)، گیلان (۳۳ نفر)، مازندران (۳۲ نفر)، گلستان (۱۱ نفر)، یزد (۲۲ نفر)، زنجان (۲۴ نفر)، ایلام (۲۲ نفر)، اردبیل (۲۷ نفر) و خراسان (۴۸ نفر) نمونه‌گیری به عمل آمد. نمونه‌گیری به روش احتمالی از نوع تصادفی ساده بود. رشتۀ‌ی ورزشی این ورزشکاران والیبال [۲۰۵ نفر (٪۳۲/۶)]، بسکتبال [۱۶۶ نفر (٪۲۶/۴)]، هندبال [۱۲۷ نفر (٪۲۰/۲)]، بدمینتون [۹۱ نفر (٪۱۴/۵)] و پینگ پنگ [۴۰ نفر (٪۶/۴)] بود.

متغیرهای مورد بررسی عبارت بودند از مرحله‌ی بلوغ پستان‌ها<sup>a</sup> و رشد موهای ناحیه‌ی پوبیس<sup>b</sup> بر اساس مرحله بندی تانر<sup>c</sup>، وزن، قد، فشارخون، سابقه‌ی بیماری‌های قلبی، ریوی، کلیوی، تیروئید، دیابت و داروهای مصرفی، درصد چربی بدن که توسط کالیپر<sup>d</sup> در محلهای شکم<sup>e</sup> درست زیر و کنار ناف، قسمت میانی عضله‌ی سهسر بازو<sup>f</sup> و کتف<sup>g</sup> و کنار ناف، قسمت میانی عضله‌ی سهسر بازو<sup>f</sup> و کتف<sup>g</sup> اندازه‌گیری شد. این اطلاعات توسط دو پزشک زن کاملاً هماهنگ جمع‌آوری شد.

به منظور تعیین درصد چربی بدن این افراد سه عدد به دست آمده توسط کالیپر با هم جمع شد. اگر این مجموع کمتر از ۲۵ میلی‌متر بود، درصد چربی بدن کمتر از ٪۷ در نظر گرفته شد و گرفته شد و فرد لاغر محسوب گردید. اگر این مجموع ۲۵-۴۸ میلی‌متر بود، درصد چربی بدن ۱۵-۱۲٪ در نظر گرفته شد و قابل قبول قلمداد شد. اگر این مجموع بیشتر از ۴۸ میلی‌متر بود درصد چربی بدن بیشتر از ۱۵٪ در نظر گرفته و فرد چاق محسوب شد.

فرم جمع‌آوری اطلاعات شامل محل زندگی در دوران کودکی از نظر ارتفاع از سطح دریا (کوهستانی، کوهپایه‌ای و کویری)، آب و هوا (گرم‌سیر، معتدل و سردسیر)، منطقه‌ی زندگی (روستایی یا شهری) و میزان تابش آفتاب (آفتابی، نیمه آفتابی یا ابری)، نوع رشتۀ‌ی ورزشی، مدت زمان شروع

بیش‌بینی زمان صحیح بلوغ در دختران باعث می‌شود بتوان آگاهی‌های لازم در این زمینه را به موقع به آنان ارائه داد و آنها را از نظر روحی برای پذیرش تحولاتی که در این دوره تجربه خواهند کرد، آماده ساخت. <sup>۲</sup> از سوی دیگر تعیین زمان بلوغ باعث می‌شود بتوان والدین و مریبان مدارس را آگاه ساخت تا بدانند که چه زمانی به فرزندان و دانش‌آموزان خود آموزش دهند. پاسخ به این سوال‌ها با یافتن عوامل مرتبط با سن شروع منارک تا حد زیادی امکان‌پذیر خواهد بود. در مطالعه‌هایی که در این زمینه در ایالات متحده انجام شد، در طول ۱۷۵ سال گذشته هر دهه، ۱ تا ۳ ماه از زمان بلوغ کاسته شده است. سن بلوغ در دختران ایالات متحده ۸ تا ۱۲ سالگی می‌باشد.<sup>۳</sup> زنان ورزشکاری که تمرین‌های خود را از سنین پایین شروع می‌کنند، در منارک خود دچار تأخیر هستند.<sup>۴</sup> در ایران هنوز مطالعه‌ای جامع در این زمینه انجام نشده است. مقایسه‌ی زمان بلوغ در گروه‌های مختلف ورزشکاران می‌تواند از این جهت کمک کننده باشد که اگر ورزش خاصی باعث تسريع در بلوغ شود می‌تواند استفاده‌ی درمانی در افرادی داشته باشد که در معرض بلوغ دیررس هستند و اگر ورزش خاصی باعث تأخیر در بلوغ شود می‌تواند استفاده‌ی درمانی در افرادی داشته باشد که در معرض بلوغ زودرس هستند.

برخی مطالعه‌های مشابه در نقاط مختلف دنیا معتقد به تأخیر زمان بلوغ در بسیاری از رشتۀ‌های ورزشی شامل ژیمناستیک،<sup>۵-۷</sup> تنیس،<sup>۸</sup> شنا<sup>۵,۸</sup> رقص باله<sup>۹</sup> و غیره هستند.

## مواد و روش‌ها

این مطالعه‌ی مقطعی - توصیفی در دختران ورزشکار ایرانی متولد سال‌های ۱۳۶۲-۱۳۶۹ شرکت کننده در المپیاد ورزشی دانش‌آموزی کشور در سال ۱۳۸۱ انجام شد. حجم نمونه با پیش فرض  $n=50/0.05$ <sup>a</sup>، حداکثر اختلاف قابل قبول با میانگین واقعی  $0.078$ <sup>b</sup>، انحراف معیار و با استفاده از فرمول برآورد یک میانگین معادل  $629$  نفر برآورد شد. با توجه به تأثیر عواملی از جمله خصوصیت‌های آب و هوایی، منطقه‌ی زندگی (روستایی یا شهری)، ارتفاع محل زندگی از سطح دریا، موقعیت جغرافیایی و تماس با نور خورشید، نمونه‌گیری از استان‌های مختلف کشور که دارای شرایط آب و هوایی و جغرافیایی متفاوتی بودند انجام شد. بنا بر این از استان‌های مختلف از جمله همدان (۴۹ نفر)، قم (۴۲ نفر)،

i- Thelarche

ii- Pubarche

iii- Tanner stage

iv- Caliper

v- Abdomen

vi- Triceps

vii- Sub scapula

خانواده، ۳ بود. میانه‌ی تعداد هم برادران و هم خواهران این افراد ۲ نفر بود. میانه‌ی بعد خانوار خانواده‌ی دختران و خانواده‌ی مادری و پدری این افراد به ترتیب ۵، ۷ و ۷ نفر بود. بر اساس مقدار چربی زیر پوستی، ۳ نفر (۰/۰۵٪) لاغر (کمتر از ۲۵ میلی‌متر)، ۳۰۰ نفر (۰/۴۸٪) متوسط (۲۵-۴۸ میلی‌متر) و ۳۲۰ نفر (۰/۵۱٪) چاق (بیش از ۴۸ میلی‌متر) بودند.

میانگین وزن بدو تولد این افراد  $3/2 \pm 0/04$  کیلوگرم بود. ۲۶ نفر در بدو تولد (%۶/۹) کمتر از  $2/2$  کیلوگرم و ۱۳ نفر (%۳/۴) بیشتر از  $4/5$  کیلوگرم بودند. میانگین وزن و قد فعلی این افراد  $3/2 \pm 0/04$  کیلوگرم و  $2/7 \pm 0/05$  سانتی‌متر بود. میانگین نمایه‌ی توده بدنی<sup>۱</sup> در این افراد  $2/0 \pm 0/05$  کیلوگرم بر مترمربع بود. ۹۵٪ این افراد دارای نمایه‌ی توده بدنی کمتر از ۲۵ کیلوگرم بر مترمربع بودند.

افزایش وزن مادر طی حاملگی این فرزندان در ۷۶ نفر (%۲۴/۱) بیشتر از ۱۰ کیلوگرم و در ۲۴۰ نفر (%۷۵/۹) کمتر از ۱۰ کیلوگرم بود. در ۲۰۲ مورد (%۳۲/۶) حداقل یک فرد سیگاری در خانواده وجود داشت. سن شروع ورزش در این افراد در  $3/7$ ٪ کمتر از ۷ سالگی، در  $7/5 \pm 0/76$  سالگی و در  $19/8$ ٪ بعد از ۱۲ سالگی بود. میانگین سن شروع ورزش در  $10/8 \pm 0/09$  سال و محدوده‌ی آن از ۳ تا ۱۶ سالگی متغیر بود. ۴۲٪ افراد از سن ۱۱ سالگی ورزش را شروع کرده بودند. میانگین زمان ورزش در هفته  $2/1 \pm 0/65$  ساعت (محدوده‌ی آن ۱ تا ۳۶ ساعت) بود. بیشترین گروه که  $16\%$  افراد را تشکیل می‌دادند، ۶ ساعت در هفته ورزش می‌کردند. درآمد ماهیانه‌ی خانواده در هزار ۸۳ نفر (%۱۴/۷) کمتر از ۱۰۰ هزار تومان، ۳۳۹ نفر (%۵۹/۹) ۱۰۰-۳۰۰ هزار تومان، ۸۷ نفر (%۱۵/۴) ۳۰۰-۵۰۰ هزار تومان و ۵۷ نفر (%۱۰/۱) بیشتر از ۵۰۰ هزار تومان در هر ماه در سال ۱۳۸۱ بود.

۲۱٪ از افرادی که منارک آنها شروع شده بود سابقه‌ای از استرس‌هایی از مانند مرگ والدین (۱۲/۳٪)، بیماری (۷/۵٪)، تصادف (۰/۹٪)، اعتیاد والدین (۷/۰٪) و طلاق (۰/۰٪) را قبل از شروع قاعده‌گی می‌دادند. در مقابل، ۱۳٪ از افرادی که منارک آنها شروع نشده بود نیز سابقه‌ای از استرس‌هایی از مانند مرگ والدین (۸/۹٪) و بیماری (۴/۴٪) را می‌دادند. تحلیل آماری نشان داد که این اختلاف از نظر وجود استرس

ورزش در هفته قبل از شروع قاعده‌گی، گراوید<sup>i</sup> و پارته<sup>ii</sup> مادر، تعداد خواهران و برادران (بعد خانوار)، سیگاری غیرفعال بودن<sup>iii</sup>، ردی تحریلی، سن دقیق شروع اولین عادت ماهیانه، وزن بدو تولد، میزان افزایش وزن مادر طی حاملگی، استرس‌های پیش آمده در زندگی در زمان قبل از بلوغ، سن تقریبی شروع اولین عادت ماهیانه مادر و خواهران، مادربزرگ‌ها، خاله‌ها و عمه‌ها، تعداد خاله، دایی، عمه و عمو و درآمد ماهیانه‌ی خانواده نیز توسط افراد مورد بررسی همراه با یکی از افراد خانواده قبل از اعزام به مسابقات تکمیل شد. این فرم با هماهنگی قبلی به مراکز همه‌ی شهرستان‌ها فرستاده شده بود و از شرکت‌کنندگان در این المپیاد خواسته شده بود تا قبل از حضور در این مسابقات این فرم را تکمیل کنند.

در تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص‌های میانگین، میانه، نما، انحراف معیار، آزمون‌های آماری محدود خی، من‌ویتنی، کروسکال والیس، فویدمن، آزمون واریانس یک طرفه، ضرایب همبستگی اسپرمن، کندال، فای، اتا، کرامز و برای تخمین سن بلوغ در این افراد، از مدل رگرسیونی خطی گام به گام<sup>iv</sup> به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS 11.5 استفاده شد.

در مورد رعایت نکات اخلاقی، ضمن بی خطر بودن کامل روش انجام کار و محفوظ ماندن مشخصات افراد مورد بررسی، پای بندی به اصول اعلامیه‌ی هلسینکی در تمام مراحل طرح توسط محققان رعایت شد.<sup>v</sup> معاینه و شرح حال نیز توسط پژوهش هم‌جنس صورت گرفت.

## یافته‌ها

در این مطالعه ۶۲۹ دختر ۱۲ تا ۱۹ ساله از مقاطع مختلف راهنمایی و دبیرستانی استان‌های مختلف کشور بررسی شدند. میانگین سن دختران مورد بررسی  $18/7 \pm 0/8$  ماه بود.

شایع‌ترین رتبه‌ی تولد، فرزند سوم بود که ۲۰٪ از کل جمعیت مورد بررسی را تشکیل داد. میانه‌ی رتبه‌ی تولد در

i- گراوید عبارتست از حاملگی (زنده، مرده و سقط).

ii- پارته‌ی عبارتست از تولد یک یا چند نوزاد زنده یا مرده که حداقل ۵۰۰ گرم وزن داشته باشد یا سن حاملگی آنها حداقل ۲۰ هفت‌می‌کامل باشد.

iii- Passive smoker

iv- Stepwise linear regression model

شروع قاعده‌ی در مادر، خاله‌ها، عمه‌ها، مادربزرگ‌ها و بُعد خانواده‌ی پدری و مادری، و وجود مشکل قبل از شروع قاعده‌ی نداشت.

سن شروع قاعده‌ی ارتباط مستقیمی با قد فعلی ( $r=0.17$ ,  $p=0.001$ )، سن شروع ورزش ( $r=0.116$ ,  $p=0.019$ ) و تعداد خواهر ( $r=0.128$ ,  $p=0.007$ ) و تعداد برادر ( $r=0.14$ ,  $p=0.003$ ) و ارتباط معکوسی با درصد چربی بدن ( $r=-0.098$ ,  $p=0.037$ ) و نمایه‌ی توده‌ی بدن ( $r=-0.144$ ,  $p=0.002$ ) داشت.

میانگین سن شروع قاعده‌ی در افرادی که درصد چربی زیر جلدی آنها بیشتر از ۱۵٪ بود به طور معنی‌داری کمتر از سایرین بود ( $P=0.042$ ). این عدد در افرادی که درصد چربی زیر جلدی آنها کمتر از ۱۵٪ است بیشتر از ۱۵٪ بود به ترتیب  $160 \pm 1$ ,  $160 \pm 1$  و  $156 \pm 1$  ماه بود.

میانگین سن شروع قاعده‌ی در افراد ساکن مناطق کوهپایه‌ای ( $152 \pm 5$  ماه)، افراد ساکن مناطق کویری ( $157 \pm 6$  ماه) و در افراد ساکن مناطق کوهستانی ( $161 \pm 6$  ماه) بود که این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود ( $p=0.001$ ). این تفاوت بین مناطق کوهستانی با کوهپایه‌ای ( $p=0.028$ ) و کویری ( $p=0.001$ ) معنی‌دار بود و لی مناطق کوهپایه‌ای تفاوتی با مناطق کویری نداشتند.

این اختلاف در مورد مرحله‌ی بلوغ پستان‌ها نیز معنی‌دار بود ( $p=0.007$ ). به طوری که مناطق کوهپایه‌ای بیشترین بلوغ را از این نظر داشتند ( $3/0.5 \pm 0.1$ ) که اختلاف معنی‌داری با مناطق کوهستانی ( $0.12$ ) و کویری ( $0.09$ ) داشت. مناطق کوهستانی ( $2/0.72 \pm 0.07$ ) و کویری ( $2/0.71 \pm 0.06$ ) از این نظر اختلافی با یکدیگر نداشتند.

تفاوتی از نظر مرحله‌ی بلوغ پوییک در افراد ساکن مناطق مختلف از نظر ارتفاع محل زندگی از سطح دریا وجود نداشت.

شرایط مختلف آب و هوایی تأثیری بر سن بلوغ و نیز مرحله‌ی بلوغ پستان‌ها نداشت. مرحله بلوغ پوییک در مناطق سردسیر ( $3/0.54 \pm 0.1$ ) به طور معنی‌داری کمتر از مناطق گرمسیر ( $3/0.95 \pm 0.06$  و  $p=0.001$ ) و معتدل ( $3/0.89 \pm 0.06$  و  $p=0.008$ ) بود. مناطق گرمسیر و معتدل تفاوتی از این نظر نداشتند. بنا بر این شرایط مختلف آب و هوایی تنها بر مرحله بلوغ پوییک تأثیر معنی‌داری داشت ( $p=0.001$ ).

منطقه‌ی زندگی تنها بر مرحله‌ی رشد پستان‌ها مؤثر بود ( $p=0.048$ ). ساکنان مناطق روستایی بلوغ زودرسی از نظر

در کل) در کسانی که قاعده‌ی آنها شروع شده بود با کسانی که قاعده‌ی آنها شروع نشده بود، معنی‌دار نبود.

۱۷۵ نفر از این افراد تاریخچه‌ای از قاعده‌ی نمی‌دادند. در ۴۵۴ نفر دیگر که منارک آنها شروع شده بود، فصل شروع اولین عادت ماهیانه در  $131$  مورد ( $25/8\%$ ) بهار،  $217$  مورد ( $42/8\%$ ) تابستان،  $86$  مورد ( $17\%$ ) پاییز و  $73$  مورد ( $14/4\%$ ) زمستان بود. میانگین سن شروع قاعده‌ی در این  $454$  نفر  $13/18 \pm 0.06$  سال ( $158/2 \pm 0.06$  ماه) بود. کمترین و بیشترین سن قاعده‌ی به ترتیب  $9/25$  سال ( $111$  ماه) و  $18/17$  سال ( $218$  ماه) بود.

میانگین سن قاعده‌ی سایر اعضای خانواده‌ی این  $454$  نفر به ترتیب در مادربزرگ‌ها  $12/9 \pm 0.25$ ، مادر  $14/6 \pm 0.14$ ، خواهر اول  $13/7 \pm 0.13$ ، خواهر دوم  $15/7 \pm 0.15$ ، خواهر سوم  $13/6 \pm 0.23$ ، خواهر چهارم  $14/2 \pm 0.21$ ، خاله‌ی بزرگتر  $13/4 \pm 0.21$ ، خاله‌ی دوم  $13/4 \pm 0.25$ ، عمه‌ی اول  $12/5 \pm 0.25$  و عمه‌ی دوم  $12/4 \pm 0.26$  سالگی بود.

میانگین بلوغ پستان‌ها و پوییک بر اساس مرحله‌بندی تائز به ترتیب  $2/77 \pm 0.04$  و  $3/86 \pm 0.04$  بود. درصد افرادی که بر اساس مرحله‌بندی تائز در مراحل مختلف قرار داشتند در جدول ۱ آمده است.

جدول ۱- درصد افرادی که در مراحل مختلف مرحله‌بندی تائز قرار داشتند

Tanner stage	بلوغ پستان‌ها	بلوغ پوییک
۱	۴۷ (%) / ۷/۶	۸ (%) / ۱/۲
۲	۲۱۸ (%) / ۲۵	۵۱ (%) / ۸/۲
۳	۲۲۹ (%) / ۲۶/۸	۱۶۰ (%) / ۲۵/۸
۴	۸۵ (%) / ۱۲/۷	۲۰۵ (%) / ۳۳
۵	۴۳ (%) / ۶/۹	۱۹۷ (%) / ۲۱/۷

فاصله‌ی بین سن شروع منارک و زمان پرسش از این افراد  $21/8 \pm 0.21$  ماه بود.

هیچ یک از افراد سابقه‌ی بیماری قلبی، کلیوی، تیروئید، فشارخون بالا، دیابت، بیماری‌های ریوی و یا سابقه‌ی مصرف داروهای هورمونی نداشتند.

سن شروع قاعده‌ی ارتباطی با وزن بدو تولد افراد، افزایش وزن مادر طی حاملگی، وجود فرد سیگاری در خانواده (سیگاری غیر فعال بودن)، رتبه‌ی تولد، درآمد ماهیانه‌ی خانواده، وزن فعلی، مدت ورزش در هفت، سن

میانگین سن منارک در فصول مختلف سال اختلاف آماری معنی داری داشت ( $p=0.047$ ). کمترین میانگین مربوط به افرادی بود که در فصل بهار ( $155/9\pm1/34$ ) اولین قاعده‌گی خود را تجربه کرده بودند. بعد از آن به ترتیب تابستان ( $162/2\pm1/89$ ) و زمستان ( $157/8\pm1/13$ ، پاییز ( $159/7\pm1/76$ ) و زمستان ( $157/8\pm1/12$ ) قرار داشتند. آنالیز post hoc نشان داد که این اختلاف تنها بین بهار و زمستان معنی دار است ( $p=0.028$ ).

میانگین وزن و قد افرادی که به سن بلوغ رسیده بودند و سایر افراد مورد مطالعه که هنوز منارک آنها شروع نشده بود در جدول ۳ نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود این افراد به طور معنی داری دارای وزن و قد بیشتری نسبت به افرادی هستند که منارک آنها شروع نشده است. البته سن این افراد نیز به طور معنی داری بیشتر است که اختلاف قد و وزن هم می‌تواند به همین امر مربوط باشد. مدل معنی داری ( $R^2=0.99$ ,  $p=0.001$ ) برای تخمین سن منارک در این افراد به دست آمد. مدل رگرسیونی نشان داد که سن منارک با استفاده از متغیرهای قد فعلی ( $p<0.001$ ), ارتفاع محل زندگی از سطح دریا ( $p<0.001$ ), تعداد برادر ( $p=0.006$ ) و تعداد خواهر ( $p=0.008$ ) قابل پیش‌بینی است (جدول ۴).

رشد پستان‌ها در مقایسه با مناطق شهری داشتند ( $3/4\pm0/36$ ) در برابر  $4/2\pm0/041$ ,  $2/76\pm0/041$ .

میزان تابش آفتاب در محل سکونت افراد ارتباطی با هیچ یک از معیارهای بلوغ (سن بلوغ، مرحله بلوغ پستان‌ها و رشد موهای ناحیه پوبیس) نداشت.

اگرچه میانگین سن شروع قاعده‌گی در افرادی که رشته‌ی ورزشی آنها هندبال بود، کمتر از بقیه بود ( $155/24\pm1/65$ ) ماه) و در سایر رشته‌ها نیز به ترتیب در والیبال  $158/99\pm1/12$ ، بسکتبال  $159/17\pm1/41$ , بدمنیتون  $159/22\pm2/07$  و پینگ‌پنگ  $159/29\pm2/69$  نبود. مرحله‌ی بلوغ پستان‌ها ( $p<0.001$ ) و رشد موهای ناحیه‌ی پوبیس ( $p<0.001$ ) در رشته‌های مختلف ورزشی اختلاف معنی داری از نظر آماری داشت (جدول ۲).

جدول ۲- مرحله‌ی بلوغ پستان‌ها و رشد موهای ناحیه‌ی پوبیس در رشته‌های مختلف ورزشی

رشته ورزشی	بلوغ پستان‌ها	بلوغ ناحیه پوبیس
هندبال	$3/13\pm0/1$	$4/18\pm0/9$
والیبال	$2/8\pm0/7$	$4\pm0/7$
بسکتبال	$2/66\pm0/07$	$2/59\pm0/8$
بدمنیتون	$2/54\pm0/1$	$2/71\pm0/1$
پینگ‌پنگ	$2/48\pm0/1$	$2/5\pm0/16$

جدول ۳- میانگین وزن، قد و سن افرادی که به سن بلوغ رسیده بودند و سایر کسانی که هنوز منارک آنها شروع نشده بودند

مقدار P	افرادی که به سن بلوغ رسیدند			افرادی که به سن بلوغ رسیدند		
	خطای معیار	میانگین	تعداد	خطای معیار	میانگین	تعداد
<0.001	0/7	51/1	172	0/3	54/5	451
<0.001	0/6	159/8	172	0/3	162/1	451
<0.001	1/6	181/3	175	0/92	190	454

جدول ۴- متغیرها و ضرایب مدل رگرسیونی پیشگویی کننده‌ی زمان منارک (ماه)

مقدار P	ضرایب استاندارد شده			متغیرها
	Beta	Standard error	B	
<0.001	0/173	0/112	0/404	قد فعلی
<0.001	-0/168	0/789	-2/772	ارتفاع از سطح دریا*
0.006	0/132	0/544	1/49	تعداد برادران
0.008	0/127	0/425	1/128	تعداد خواهران
<0.001	-	18/0.88	92/78	مقدار ثابت

\*: ۱- کوهستانی، ۲- کوهپایه‌ای و ۳- کویری

## بحث

شدید است.<sup>۱۶</sup> سن شروع ورزش ارتباط مستقیمی با سن شروع منارک داشت که نشان‌گر اثر مثبت ورزش خفیف بر شروع زودتر منارک است. از طرف دیگر، مطالعه‌های دیگر معتقد به تأخیر شروع منارک در افرادی هستند که قبل از بلوغ، تمرينات شدید ورزشی خود را شروع می‌کنند.<sup>۱۷</sup>

اگرچه به نظر می‌رسد که اضطراب می‌تواند باعث تأخیر شروع قاعده‌گی شود،<sup>۱۸</sup> در این مطالعه اختلافی از این نظر بین افرادی که قاعده‌گی آنها شروع شده بود با افرادی که قاعده نشده بودند، وجود نداشت.

همان‌طور که می‌دانیم سن بلوغ پایین‌تر باعث زودتر بسته‌شدن فیزیوگرافی استخوانی شده و در نتیجه از رشد طولی افراد می‌کاهد.<sup>۱۹</sup> در این مطالعه نیز بلوغ زودتر با قد کوتاه‌تر همراهی داشت. یعنی افراد فاقد کوتاه‌تر، زودتر منارکشان شروع شده بود. یک مطالعه هندی نیز نشان داد که دختران با منارک دیررس، به طور متوسط، قد بلندتری به نسبت وزن، از افراد دارای بلوغ زودرس دارند.<sup>۲۰</sup>

در مطالعه‌ای که اخیراً بر روی ژیمناست‌های ریتمیک یونانی و کانادایی انجام شده است، تأخیر در منارک، اختلال‌های (بی‌نظمی‌های) قاعده‌گی و چربی بدنی کمتر در این افراد در مقایسه با گروه شاهد دیده شد.<sup>۲۱</sup>

بعد خانوار (تعداد خواهر و برادر) بیشتر، ارتباط مستقیمی با افزایش سن منارک داشت. شاید ایجاد شرایط روحی - عاطفی یا شلوغی خانواده در این امر دخیل باشد یا اینکه بعد خانوار و سن دیرتر منارک هر دو ناشی از مسایل دیگر مثل سطح اجتماعی - اقتصادی پایین این افراد باشد. در آمد ماهیانه‌ی کمتر از ۳۰۰ هزار تومان در ۶۴٪ این افراد با میانگین بُعد خانوار ۶ نفر گویای سطح اقتصادی متوسط تا پایین این افراد است.

درصد چربی بدن ارتباط معکوسی با سن شروع قاعده‌گی داشت. شاید درصد چربی پایین با سطح پایین‌تری از هورمون‌های جنسی همراه باشد که این خود باعث تأخیر در بلوغ افراد دارای درصد چربی پایین شده است. از طرف دیگر چاقی بیش از حد نیز می‌تواند با بیماری‌هایی همراه باشد که می‌توانند از علل تأخیر در بلوغ باشند ولی در این مطالعه با توجه به نمایه‌ی توده‌ی بدن کمتر از ۲۵ کیلوگرم بر متر مربع در ۹۵٪ افراد اکثر افراد، دارای جثه‌ی طبیعی یا لاغر بودند. نمایه‌ی توده‌ی بدن در این مطالعه، مانند مطالعه‌های دیگر،<sup>۲۲</sup> ارتباط معکوسی با سن شروع منارک

زمان منارک یک موضوع عینی (objective) و قابل اندازه‌گیری کمی و به معنی زمان شروع بلوغ در دختران است. در آمریکا در مقایسه با اوایل دهه‌ی ۹۰، امروزه دختران در سنین پایین‌تری به بلوغ رسیده و منارک آنها شروع می‌شود.<sup>۲۳</sup> در طول ۲۰ سال گذشته، سن منارک در مسکو از ۱۲/۶ سال به ۱۲ سال افزایش یافته است.<sup>۲۴</sup> در ایران نیز سن منارک در طول ۹ سال از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ که به طور معنی‌داری ( $p=0.001$ ) از  $13/86 \pm 1/51$  به  $12/65 \pm 1/47$  سال رسیده است.<sup>۲۵</sup> مقایسه‌ی میانگین سن قاعده‌گی مادربزرگ‌ها به عنوان نسل قدیمی‌تر با مادرها، خاله‌ها و عمه‌ها به عنوان نسل جدیدتر و فرزندان به عنوان جدیدترین نسل گویای افزایش سن قاعده‌گی در نسل جدیدتر در مقایسه با نسل‌های گذشته است. حتی در خواهران چهارم نسبت به خواهران دیگر این افزایش واضح است. خطای معیار این ارقام گویای این افزایش معنی‌دار است.

یکسان بودن شرایط ژنتیک، خانوادگی، اقلیمی و تغذیه‌ای در هر خانواده امکان مقایسه‌ی خواهران را از نظر سن شروع منارک کاملاً فراهم می‌کند. علی‌رغم این که منابع معتقد به کاهش سن منارک طی گذشت زمان هستند،<sup>۲۶-۲۸</sup> در این افراد الگویی متفاوت مشاهده شد که می‌تواند به علت ورزشکار بودن این افراد باشد. البته با ورزش مقدار میانگین کمتر از ۶ ساعت در هفته که در افراد مورد مطالعه دیده شد، این افراد ورزشکار حرفه‌ای محسوب نمی‌شوند.<sup>۲۹</sup> به علاوه خواهران این افراد، که در مورد ورزشکار بودن آنها اطلاعات دقیقی در دست نیست، دارای میانگین سن منارک بالاتری بودند. اگرچه میانگین سن شروع منارک در ۴۵۴ نفری که به سن بلوغ رسیده بودند ۱۲/۲ سال بود، در ۱۷۵ نفر هنوز منارک شروع نشده بود یعنی سن شروع منارک در این افراد ۱۲/۲ سال هم بود. بنا بر این نه تنها کاهشی در سن شروع منارک وجود نداشت بلکه افزایش هم دیده شد. این مسئله کاربرد بالینی، آموزشی و اجتماعی مهمی دارد.

میانگین سن شروع ورزش در این افراد ۱۰/۸ سالگی با میانگین ۶/۵ ساعت در هفته و میانگین سن شروع منارک ۱۲/۲ سالگی بود. این شاخص گویای شدت ورزش قبل از شروع منارک است که نسبتاً متوسط تا خفیف به نظر می‌رسد. ورزش بیشتر از ۷ ساعت در روز نشان‌گر ورزش

داد که ۱۲٪ آنها اولین قاعده‌گی خود را در سنین دبستان تجربه می‌کنند. اهمیت این امر در لزوم توجه به امکانات بهداشتی و در اختیار قرار دادن اطلاعات و آموزش‌های لازم در این زمینه به دختران در این سنین است تا پوشش فراغیر و مناسبی به وجود آید. مسایل روحی - روانی نیز بسیار مهم است و در کنار امکانات مذکور، از ارزش ویژه‌ای برخوردار است که نیاز به برنامه‌ریزی در این زمینه را در سنین پایین برای دختران کاملاً بیان می‌کند.

از طرف دیگر شروع این آموزش‌ها برای افراد ساکن مناطق کوهپایه‌ای، کویری و افراد دارای قد بلندتر یا افرادی که در خانواده‌های شلوغ زندگی می‌کنند باید زودتر صورت گیرد زیرا این افراد دارای منارک زودرس هستند.

مطالعه‌های دیگر نیز تأثیری مشابه نتایج مطالعه‌ی حاضر در مورد نمایه‌ی توده‌ی بدن، چاقی، سطح اقتصادی - اجتماعی و بعد خانوار را بر سن منارک نشان داده‌اند.<sup>۲۲</sup>

فصل شروع قاعده‌گی در اکثر افراد (۴۲/۸٪) تابستان بود. لذا گرمی هوا از عوامل مؤثر در شروع منارک به نظر می‌رسد. آرامش بیشتر در این فصل به علت تعطیلات نیز شاید از عوامل مؤثر در شروع منارک در فصل تابستان باشد.

افراد ساکن مناطق کوهستانی دیرتر دچار منارک شده بودند که این نیز دلالت بر اثر سردی هوا در تأخیر شروع سن منارک دارد. منابع نیز نشان داده‌اند که ارتفاع کمتر محل زندگی و نزدیکی به استوا باعث شروع زودتر منارک می‌شود.<sup>۲۳</sup>

در این مطالعه سن شروع منارک بر اساس یادآوری بود و ممکن است دقیق نباشد. همچنین فاصله‌ی بین سن شروع منارک و زمان پرسش از این افراد  $31/8 \pm 0/84$  ماه بود. در مطالعه‌های مشابه این رقم در حدود ۳ سال بود.<sup>۲۴</sup> مطالعه‌های دیگر نشان داده‌اند که در این محدوده‌ی زمانی یادآوری سن منارک توسط این گروه سنی کاملاً دقیق است.<sup>۲۵</sup> به هر حال مطالعه‌های دیگر معتقدند که فاصله‌ی بیشتر از این، میان زمان شروع منارک تا پرسش از دختران راجع به زمان شروع منارک، باعث کاهش دقت نتایج می‌گردد.<sup>۲۶</sup> به تازگی نیز مطالعه‌ای، همبستگی قوی معنی‌داری را ( $p=0/001$ ) بین سن واقعی و یادآوری شده‌ی منارک نشان داد.<sup>۲۷</sup>

مدل رگرسیونی نشان می‌دهد که قد فعلی افراد ( $p<0/001$ )، ارتفاع محل زندگی از سطح دریا ( $p<0/001$ )، تعداد برادران

داشت. در مطالعه‌ای روی ۱۴۷ زن جوان بالغ هندی نشان داده شد که دختران با سن بلوغ زودرس (۱۰-۱۱ سالگی) وضعیت جسمانی کوچکتری (طولی - عرضی) و چربی زیر جلدی بیشتری داشتند.<sup>۲۸</sup> به نظر می‌رسد که عدم ارتباط وزن با سن شروع منارک در مطالعه‌ی حاضر به علت عدم تفاوت معنی‌دار وزن افراد مورد مطالعه با یکیگر باشد، با این حال در قد افراد در این مطالعه ارتباط مستقیمی با سن شروع منارک داشت. مطالعه‌ی زاخاریاس و همکاران بر روی ۷۸۱ دختر آمریکایی با سطح اجتماعی - اقتصادی متوسط نشان داده دخترانی که زودتر به سن منارک می‌رسند دارای قد بلندتر و وزن بیشتری از دختران قبل از سن منارک هستند، اما بلوغ جنسی و فیزیکی با هم رخ می‌دهند.<sup>۲۹</sup> در مطالعه‌ی حاضر نیز وزن و قد افرادی که به بلوغ رسیده بودند بیشتر از سایرین بود که البته این اختلاف ساختگی به نظر می‌رسد زیرا افرادی که منارک آنها شروع شده بود دارای سن بیشتری نیز بودند و طبیعی است که قد و وزن بیشتری هم داشته باشند. مطالعه‌هایی که برای بررسی ارتباط نمایه‌ی توده‌ی بدن با سن شروع منارک طراحی شده‌اند نشان داده‌اند که دخترانی که زودتر منارک آنها شروع می‌شود چاق‌تر از بالغان هستند.<sup>۳۰</sup> مطالعه‌های دیگر در زمینه‌ی ارتباط نمایه‌ی توده‌ی بدن و سن شروع منارک نشان داده‌اند که عوامل محیطی و تغذیه‌ای نیز مانند عوامل ژنتیک می‌توانند در این امر مؤثر باشند.<sup>۳۱-۳۷</sup> این تئوری که تغذیه‌ی بهتر و افزایش چربی بدن دلیلی بر منارک زودرس می‌باشد با مشاهده‌ی افزایش پیوسته و آرام وزن بدن و شیوع چاقی در کودکان آمریکایی طی دهه‌های گذشته تا حدی تأیید می‌شود.<sup>۳۸</sup> مطالعه‌های دیگر نیز نشان دادند که ریبانه چربی در اطفال دارای نمایه‌ی توده‌ی بدن بیشتر زودتر رخ می‌دهد.<sup>۳۹</sup> بنا بر این آموزش‌های مورد نیاز در این زمینه باید برای دختران چاق‌تر زودتر شروع شود.<sup>۳۰</sup> در مطالعه‌ی حاضر نیز افراد چاق‌تر بر اساس درصد چربی زیر جلدی دارای سن شروع منارک پایین‌تری بودند.

در انگلستان مطالعه روی ۱۱۱۶ دختر ۱۲-۱۶ ساله نشان داد که میانگین سن اولین عادت ماهانه ۱۲ سال و ۱۱ ماه است که در مقایسه با ۲۰-۳۰ سال گذشته تنها کمتر از ۶ ماه کاهش داشته است.<sup>۳۱</sup>

این رقم همان عددی است که منابع آمریکایی<sup>۳۲</sup> نیز نشان داده‌اند. آنها معتقد به کاهش ۱-۳ ماه در سن اولین قاعده‌گی به ازای هر دهه هستند. مطالعه در دختران انگلیسی<sup>۳۳</sup> نشان

ورزشکاران سایر رشته‌ها است.<sup>۵-۱۰</sup> به هر حال بررسی جامع‌تر از نظر رشته‌های مختلف ورزشی پیشنهاد می‌شود. با توجه به حضور ۲۴ استان از ۲۹ استان کشور در این مطالعه به نظر می‌رسد که نتایج این مطالعه به دختران ورزشکار ایرانی که مدت ورزش آنها ۶/۵ ساعت در هفته و قبل از سن ۱۱ سالگی باشد، تا حدودی قابل تعمیم است.

### نتیجه‌گیری

به طور کلی، به نظر می‌رسد که بعد از کاهش معنی‌دار سن منارک به علت بهبود کیفیت تغذیه دختران جوان طی دهه‌های اخیر، امروزه سیر افزاینده آن می‌تواند ناشی از عادات تغذیه‌ای ضعیف و نحوه‌ی زندگی کم تحرک باشد که باعث چاق‌تر شدن نسل جوان شده است. به هر حال، بعضی از مؤلفان معتقدند که تأخیر اخیر در بلوغ می‌تواند پاسخی به افزایش استرس‌های فیزیکی و روانی باشد.<sup>۷۸</sup>

(p=۰/۰۰۶) و تعداد خواهران (p=۰/۰۰۸) به ترتیب مؤثرترین عوامل در پیش‌بینی زمان شروع منارک در این دختران ورزشکار است. ضریب استانداردشده بتأکید به ترتیب ۰/۱۷۳، ۰/۱۶۸ و ۰/۱۲۷ می‌باشد که قد کوتاه‌تر افراد، این متغیرها است. این مدل نشان می‌دهد که قد کوتاه‌تر افراد، بعد خانوار کمتر و ساکن بودن در مناطق کوهپایه‌ای مهم‌ترین عوامل پیشگویی‌کننده شروع زودرس منارک هستند. به عبارت دیگر تأثیر سایر عوامل مؤثر در سن منارک که در آنالیز تحلیلی مطرح شده است از طریق ارتباط آنها با این متغیرها است. متغیرهای رشد فیزیکی مانند وزن و چربی بدن، پیشگویی‌کننده شروع منارک در یک مطالعه مشابه بودند.<sup>۷۷</sup>

رشته‌های مختلف ورزشی تفاوتی اندک از نظر سن شروع منارک داشتند که معنی‌دار نبود. منابع معتقدند که سن شروع منارک در بعضی از رشته‌های ورزشی بیشتر از

### References

- Wiest J, Lyle RM. Physical activity and exercise: a first step to health promotion and disease prevention in women of all ages. *Womens Health Issues* 1997; 7: 10-6
- Adams Hillard PJ. Menstruation in young girls: a clinical perspective. *Obstet Gynecol* 2002; 99: 655-62
- Ganong WF. Physiology of reproduction in women. In: Decherney AH, Nathan L, editors. *Current Obstetric & Gynecological Diagnosis & Treatment*. 9th ed. New York: McGraw-Hill 2002. P. 130.
- Klentrou P, Plyley M. Onset of puberty, menstrual frequency, and body fat in elite rhythmic gymnasts compared with normal controls. *Brit J Sports Med* 2003; 37: 490-4
- Baxter-Jones ADG, Helms P, Baines-Preece J, Preece M. Menarche in intensively trained gymnasts, swimmers and tennis players. *Ann Hum Biol* 1994; 21: 407-15.
- Claessens AL, Malina RM, Lefevre J, Beunen G, Stijnen V, Maes H, et al. Growth and menarcheal status of elite female gymnasts. *Med Sci Sports Exerc* 1992; 24: 755-63.
- Georgopoulos N, Markou K, Theodoropoulou A, Paraskevopoulou P, Varaki L, Kazantzis Z, et al. Growth and Pubertal Development in Elite Female Rhythmic Gymnasts. *J Clin Endocrinol Metab* 1999; 84: 4525-30C.
- Constantini NW, Warren MP. Menstrual dysfunction in swimmers: a distinct entity. *J Clin Endocrinol Metab* 1995; 80: 2740-4.
- Valentino R, Savastano S, Tommaselli AP, D'Amore G, Dorato M, Lombardi G. The influence of intense ballet training on trabecular bone mass, hormone status, and gonadotropin structure in young women. *J Clin Endocrinol Metab* 2001; 86: 4674-8.
- Needlman RD. Growth and development. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB, editors. *Nelson textbook of pediatrics*. 16th ed. Philadelphia: Saunders 2000. p. 52-4.
- Smith T. *Ethics in Medical Research*. New York: Cambridge University Press 1999. p. 12-49.
- Lin-Su K, Vogiatzi MG, New MI. Body mass index and age at menarche in an adolescent clinic population. *Clin Pediatr* 2002; 41: 501-7.
- Iampol'skaia IuA. Dynamics of puberty levels in girls of Moscow. *Gig Sanit* 1997; (3): 29-30
- Mohammad K, Zeraati H, Majdzadeh R, Karimloo M. Evaluating the trend of change in the mean onset age of menarche in Iranian girls. *J Reprod & Infertil* 2006;6(5): 523-30.
- Blythe MJ, Rosenthal SL. Female adolescent sexuality. Promoting healthy sexual development. *Obstet Gynecol Clin North Am* 2000; 27: 125-41.
- Theintz G, Ladame F, Howald H, Weiss U, Torresani T, Sizonenko PC. The child, growth and high-level sports. *Schweiz Z Med Traumatol* 1994; (3): 7-15
- Broso R, Subrizi R. Gynecologic problems in female athletes. *Minerva Ginecol* 1996; 48: 99-106.
- Tahirovic HF. Menarchal age and the stress of war: an example from Bosnia. *Eur J Pediatr* 1998; 157: 978-80.
- Huanjiu Xi, Jinping Li, Xuejing Gu. Epiphysis-diaphysis fusion in the long bones forming knee joint of the rural children and youths in Kalyuan, Liaoning. *Acta Anthropol Sin* 1995; 14: 157-61
- Sharma K, Talwar I, Sharma N. Age at menarche in relation to adult body size and physique. *Ann Hum Biol* 1988; 15: 431-4.
- Zacharias L, Rand NAI, Wurtman R. A prospective study of sexual development and growth in American girls: the statistics of menarche. *Obstet Gynecol Surv* 1976; 31: 325-37.
- Baker ER. Body weight and the initiation of puberty. *Clin Obstet Gynecol* 1985; 28: 573-9.

23. Rolland-Cachera MF, Deheeger M, Guilloud-Bataille M, Avons P, Patois E, Sempe M. Tracking the development of adiposity from one month of age to adulthood. *Ann Hum Biol* 1987; 14: 219-29.
24. Wakeling A, Russell G. Disturbances in the regulation of body temperature in anorexia nervosa. *Psychol Med* 1970; 1: 30-9.
25. Frisch R, McArthur J. Menstrual cycles: fatness as a determinant of minimum weight for height necessary for their maintenance or onset. *Science* 1974; 185: 949-51.
26. Frisch R. Weight at menarche: similarity for well-nourished and undernourished girls at differing ages, and evidence for historical constancy. *Pediatrics* 1972; 50: 445-50.
27. Frisch R, Revelle R. Height weight at menarche and a hypothesis of critical body weights: and adolescent events. *Science* 1970; 169: 397-9.
28. Ogden CL, Troiano RP, Briefel RR, Kuczmarski RJ, Flegal KM, Johnson CL. Prevalence of overweight among preschool children in the United States, 1971 through 1994. *Pediatrics* 1997; 99: E1.
29. Williams S, Dickson N. Early growth, menarche, and adipose rebound. *Lancet* 2002; 359: 580-1.
30. Manore MM. Dietary recommendations and athletic menstrual dysfunction. *Sports Med* 2002; 32: 887-901.
31. Whincup PH, Gilg JA, Odoki K, Taylor SJC, Cook DG. Age of menarche in contemporary British teenagers: survey of girls born between 1982 and 1986. *BMJ* 2001; 322: 1095-6.
32. Salces I, Rebato EM, Susanne C, San Martin L, Rosique J. Familial resemblance for the age at menarche in Basque population. *Ann Hum Biol* 2001; 28: 143-56.
33. Gonzales GF, Villena A. Body mass index and age at menarche in Peruvian children living at high altitude and at sea level. *Hum Biol* 1996; 68: 265-75.
34. Damon A, Damon ST, Reed RB, Valadian I. Age at menarche of mothers and daughters, with a note on accuracy of recall. *Hum Biol* 1969; 41: 160-75.
35. Bergsten-Brucefors A. A note on the accuracy of recalled age at menarche. *Ann Hum Biol* 1976; 3: 71-3.
36. Must A, Phillips SM, Naumova EN, Blum M, Harris S, Dawson-Hughes B. Recall of Early Menstrual History and Menarcheal Body Size: After 30 Years, How well do women remember? *Am J Epidemiol* 2002; 155: 672-9.
37. Merzenich H, Boeing H, Wahrendorf J. Dietary fat and sports activity as determinants for age at menarche. *Am J Epidemiol* 1993; 138: 217-24.
38. Veronesi FM, Gueresi P. Trend in menarcheal age and socioeconomic influence in Bologna (northern Italy). *Ann Hum Biol* 1994; 21: 187-96.

***Original Article***

# Evaluation of Menarche Age and Relevant Factors in Iranian Female Participants of the 1381 Student Olympic Games

Kabir A<sup>(1)</sup>, Torkan F<sup>(2)</sup>, Hakemi L<sup>(3)</sup>

1) Nikan Health Researchers Institute; Iran University of Medical Sciences,

2) International Olympic Committee Medical Commission

3) Internal Medicine Specialist; Sports Medicine Federation of I.R. Iran

e-mail: aikabir@yahoo.com

**Abstract**

**Introduction:** Precise prediction of menarcheal age enables and prepares girls to face the changes they may experience in this period the future. In Iran, there are no available data in this regard yet. **Materials and Methods:** This cross-sectional descriptive study was done on 629 girls from 24 provinces of Iran. Relative questionnaires to collect data were filled out with the help of the participant herself and one other family member as well. The stage of maturity regarding telarche and pubarche, percent of body fat were entered based on history taken and physical examinations. For predicting menarche age in cases, the linear regression model was used. **Results:** In the 454 cases studied, menarche age, mean of age at menarche was  $13.18 \pm 0.06$  years old ( $158.2 \pm 0.7$  months). The means of menarche age in grandmothers and mothers of these 454 cases were  $12.9 \pm 0.25$  and  $13.6 \pm 0.14$  years respectively. Earlier menarche was observed in girls of lower height ( $p < 0.001$ ), girls of lower age at the beginning of study exercise ( $P = 0.019$ ), girls with lesser number of sisters ( $P = 0.007$ ), or those with lesser number of brothers ( $P = 0.003$ ), higher percent of body fat ( $P = 0.037$ ), those with higher body mass index ( $P = 0.002$ ), and those residing in mountainous regions ( $P = 0.001$ ). The regression model showed that the menarcheal age was predictable based on following variables: current height of individual ( $p < 0.001$ ); height of place of residence from sea level ( $p < 0.001$ ); number of brothers ( $P = 0.006$ ); number of sisters ( $P = 0.008$ ) [ $P = 0.001$ , R-square = 0.99]. **Conclusion:** Lower height, number of family members and residing in mountainous areas in that order are the most useful predictors of age at menarche. In recent decades, apparently there has been a significant decrease in menarcheal age due to improvement in the quality of nutrition; the increasing trend seen today could be due to both weak dietary habits and more sedentary life styles or as a response to increased physical and psychosocial stresses.

**Key Words:** Menarche age, Athlete, Women